

# Sercadis®

Tão flexível quanto as  
suas necessidades



 **BASF**

We create chemistry

Para o controlo de  
rizoctonia em batateira

# Sercadis®

## Para evitar os prejuízos provocados pela rizoctonia (*Rhizoctonia solani*) em batateira



- **Formulação líquida de fácil utilização:** suspensão concentrada (SC) contendo 300 g/l de Xemium® (fluxapiraxade)
- **Seletividade para a cultura**
- **Modo de ação do Xemium®:** afeta a respiração dos fungos através da inibição da enzima succinato desidrogenase (SDHI)
- **Polivalência:** tratamento dos tubérculos ou tratamento do solo na linha de sementeira

### Condições de Aplicação

Cultura/Doença	Dose	Volume de calda	Modo de aplicação	N.º de aplicações	Intervalo de segurança
Batata (Rizoctonia)	0,8 L/ha	60-200 L/ha	Pulverização na linha dos tubérculos, aquando da plantação	1	n.a.
Batata (Rizoctonia)	0,2 L/ton	20-40 L/ha	Tratamento de tubérculos antes da plantação	1	n.a.

Autorização de venda n.º 0949

### Como tratar: adaptar os tratamentos às condições de infestação

Tubérculos contaminados e solo são	Tratamento dos tubérculos
Tubérculos são e solo contaminado	Tratamento ao solo
Tubérculos contaminados e solo contaminado	Tratamento dos tubérculos e ao solo

**BASF Portuguesa S.A.**  
Rua 25 de Abril, 1  
2685-368 Prior Velho  
Tel 219 499 900

Fb @basf.agro.potugal  
[www.agro.basf.pt](http://www.agro.basf.pt)

  
We create chemistry