

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MENORES																	
(a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	A/ Livre/ Protegida /Interior	Inimigo/Efeito a atingir	Nome Científico	Requerente do UM	Designação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº máx./intervalo (mín- máx) (dias)	Voluma de Cálida (mín-máx)	Dose (mín-máx)	L. de Segurança/L. de Reentrada	Condições de utilização específicas
Amendoeira	<i>Prunus dulcis</i>	-	A	Antracnose	<i>Colletotrichum</i> sp.	COTHN-CC	CABRIO WG	AV	1138	Fungicida	piradostrobina		2 / 10 - 14	400 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	28 / -	Realizar no máximo 2 aplicações por cultura, com fungicidas do grupo dos Qol.
Diospíreiro	<i>Diospyros kaki</i>	-	A	Mancha-circular	<i>Plurivora-sphaerella nawae</i>	-	CABRIO WG	AV	1138	Fungicida	piradostrobina		2 / - 15	1000 -	500 g/ha	100 / -	Autorizado ao abrigo do artigo 51º, a eficácia e a fitotoxicidade são da responsabilidade do utilizador do produto. Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos por campanha com este fungicida ou outro do grupo dos Qol.
Limoeiro	<i>Citrus limon</i>	-	A	Alternariose	<i>Alternaria</i> sp.	BASF	CABRIO WG	AV	1138	Fungicida	piradostrobina		4 / - 14	1000 -1500 L/ha	1,125 g/ha	21 / -	O produto possui uma persistência biológica de 14 dias. Para evitar o desenvolvimento de resistências, o número máximo de tratamentos por ciclo cultural e no conjunto das doenças é de 4 com este fungicida ou outros Qol. Alternar com fungicidas com modos de ação diferentes.
Nogueira	<i>Juglans regia</i>	-	A	Antracnose	<i>Ophiognomonía leptostyla</i>	COTHN - Centro Operacional e Tecnológico Hortofrutícola Nacional - Estrada de Leiria, S/N 2460-059 Alcobaca	CABRIO WG	AV	1138	Fungicida	piradostrobina		2 / 14 - 30	300 - 1000 L/ha	0,625 kg/ha	28 / -	Máximo de 2 tratamentos por ano, com este ou outros fungicidas do grupo Qol. Alternar com produtos com diferente modo de ação.
Tangerineira (inclui clementina e híbridos)	<i>Citrus reticulata</i>	-	A	Alternariose	<i>Alternaria</i> sp.	BASF	CABRIO WG	AV	1138	Fungicida	piradostrobina		4 / - 14	1000 -1500 L/ha	1,125 g/ha	21 / -	O produto possui uma persistência biológica de 14 dias. Para evitar o desenvolvimento de resistências, o número máximo de tratamentos por ciclo cultural e no conjunto das doenças é de 4 com este fungicida ou outros Qol. Alternar com fungicidas com modos de ação diferentes.