						(a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)	EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MENORES								
Cultura	Nome Ciêntifico	Situação Particular Ar l	Livre/ Protegida /Interior	n Inimigo/Efeito a atingir	Nome Ciêntifico	Requerente do UM	Designação Comercial Autori	ização Nún	nero Função	Substância(s) ativa(s) Época ou Estado Fenológico	Nº máximo/intervalo (min-máx) (dias)	Volume de Calda (min-max)	Dose (min-max)	L. de Segurança/L. d Reentrada	Cond. e Restrições Específicas Máximo 6 aplicações por
Abóbora (abóbora-almiscarada, abóbora-manteiga)	Cucurbita moschata	-	A + P	Oídio	Golovinomyces cichoracearum	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	cultura , no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-almiscarada, abóbora-manteiga)	Cucurbita moschata	-	A + P	Rizoctonia	Thanatephorus solani	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-almiscarada, abóbora-manteiga)	Cucurbita moschata	-	A + P	Alternariose	Alternaria cucumerina	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
Abóbora (abóbora-almiscarada, abóbora-manteiga)	Cucurbita moschata	-	A + P	Cancro-gomoso	Stagonosporopsis cucurbitacearum	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	inimigos.  Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
Abóbora (abóbora-cabaça)	Lagenaria siceraria	-	A + P	Cancro-gomoso	Stagonosporopsis cucurbitacearum	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	inimigos.  Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
Abóbora (abóbora-cabaça)	Lagenaria siceraria		A + P	Rizoctonia	Thanatephorus solani	BASF			+	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	inimigos.  Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,										inimigos. Máximo 6 aplicações por
Abóbora (abóbora-cabaça)	Lagenaria siceraria	-	A + P	Alternariose	Alternaria cucumerina	BASF				Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	cultura , no conjunto dos inimigos. Máximo 6 aplicações por
Abóbora (abóbora-cabaça)	Lagenaria siceraria	-	A + P	Oídio	Golovinomyces cichoracearum	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	cultura , no conjunto dos inimigos . Máximo 6 aplicações por
Abóbora (abóbora-chila)	Cucurbita ficifolia	-	A + P	Cancro-gomoso	Stagonosporopsis cucurbitacearum	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	cultura , no conjunto dos inimigos . Máximo 6 aplicações por
Abóbora (abóbora-chila)	Cucurbita ficifolia	-	A + P	Rizoctonia	Thanatephorus solani	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	cultura , no conjunto dos inimigos . Máximo 6 aplicações por
Abóbora (abóbora-chila)	Cucurbita ficifolia	-	A + P	Alternariose	Alternaria cucumerina	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	cultura , no conjunto dos inimigos .
Abóbora (abóbora-chila)	Cucurbita ficifolia	-	A + P	Oídio	Golovinomyces cichoracearum	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-menina)	Cucurbita maxima	-	A + P	Oídio	Golovinomyces cichoracearum	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-menina)	Cucurbita maxima	-	A + P	Rizoctonia	Thanatephorus solani	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-menina)	Cucurbita maxima	-	A + P	Alternariose	Alternaria cucumerina	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-menina)	Cucurbita maxima	-	A + P	Cancro-gomoso	Stagonosporopsis cucurbitacearum	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-porqueira)	Cucurbita pepo	-	A + P	Oídio	Golovinomyces cichoracearum	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-porqueira)	Cucurbita pepo	-	A + P	Rizoctonia	Thanatephorus solani	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
Abóbora (abóbora-porqueira)	Cucurbita pepo	-	A + P	Alternariose	Alternaria cucumerina	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	inimigos.  Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
Abóbora (abóbora-porqueira)	Cucurbita pepo	-	A + P	Cancro-gomoso	Stagonosporopsis cucurbitacearum	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	inimigos.  Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
Aboborinha (="courgette")	Cucurbita pepo var. giromontiina	-	A + P	Oídio	Golovinomyces cichoracearum	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	inimigos.  Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
Aboborinha (="courgette")	Cucurbita pepo var. giromontiina	<u>-</u>	A + P	Rizoctonia	Thanatephorus solani	BASF				a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	inimigos.  Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
					•										inimigos. Máximo 6 aplicações por
Aboborinha (="courgette")	Cucurbita pepo var. giromontiina	-	A + P	Alternariose	Alternaria cucumerina	BASF			+	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	cultura , no conjunto dos inimigos. Máximo 6 aplicações por
Aboborinha (="courgette")	Cucurbita pepo var. giromontiina	-	A + P	Cancro-gomoso	Stagonosporopsis cucurbitacearum	BASF				Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	cultura , no conjunto dos inimigos .  Máximo 6 aplicações por
Actinidia (=kiw i)	Actinidia deliciosa	-	A	Bacteriose-PSA	Pseudomonas syringae pv. actinidiae	BASF			-	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	cultura , no conjunto dos inimigos . Máximo 6 aplicações por
Actinidia (=kiw i)	Actinidia deliciosa	-	Α	Podridão-cinzenta	Botrytis cinerea	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	cultura , no conjunto dos inimigos. Máximo até 5 aplicações por
Alface	Lactuca sativa	"Baby leaf" (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A + P	Podridão-cinzenta	Botrytis cinerea	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	5 / - 5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Alface	Lactuca sativa	"Baby leaf" (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A + P	Sclerotinia	Sclerotinia minor	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	5/-5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Alface	Lactuca sativa	"Baby leaf" (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A + P	Podridão-branca	Sclerotinia sclerotiorum	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	5 / - 5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Alface	Lactuca sativa	"Baby leaf" (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A + P	Rizoctonia	Thanatephorus solani	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	5/-5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Amendoim	Arachis hypogaea	-	Α	Sclerotinia	Sclerotinia sp.	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Canábis (medicinal)	Cannabis sp.	-	A + P	Podridão-cinzenta	Botrytis cinerea	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Couve-brócolo	Brassica oleracea var. italica	-	Α	Estenfiliose	Stemphylium sp.	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
Couve-brócolo	Brassica oleracea var. italica	-	A	Bacteriose	Pseudomonas sp.; Xanthomonas sp.	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	inimigos.  Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
Couve-brócolo	Brassica oleracea var. italica	_	A	Alternariose	Alternaria brassicae; Alternaria brassicicola	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	inimigos. Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
Couve-coração	Brassica oleracea var. capitata f. conica	-	A	Estenfiliose	Stemphylium sp.	BASF		AV 12	86 Fungicio	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	inimigos. Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
	Brassica oleracea var. capitata f. conica		Λ	Bacteriose	Pseudomonas sp.; Xanthomonas sp.	BASF				a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	inimigos. Máximo 6 aplicações por
Couve-coração	<u>'</u>		. A												cultura , no conjunto dos inimigos. Máximo 6 aplicações por
Couve-coração	Brassica oleracea var. capitata f. conica	-	Α	Alternariose	Alternaria brassicae; Alternaria brassicicola	BASF			-	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	cultura , no conjunto dos inimigos. Máximo 6 aplicações por
Couve-de-Bruxelas	Brassica oleracea var. gemmifera	-	Α	Bacteriose	Pseudomonas sp.; Xanthomonas sp.	BASF		AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	cultura , no conjunto dos inimigos . Máximo 6 aplicações por
Couve-de-Bruxelas	Brassica oleracea var. gemmifera	-	А	Estenfiliose	Stemphylium sp.	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	cultura , no conjunto dos inimigos. Máximo 6 aplicações por
Couve-de-Bruxelas	Brassica oleracea var. gemmifera	-	A	Alternariose	Alternaria brassicae; Alternaria brassicicola	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	cultura , no conjunto dos inimigos . Máximo 6 aplicações por
Couve-flor	Brassica oleracea var. botrytis	-	A	Estenfiliose	Stemphylium sp.	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	cultura , no conjunto dos inimigos . Máximo 6 aplicações por
Couve-flor	Brassica oleracea var. botrytis	-	Α	Bacteriose	Pseudomonas sp.; Xanthomonas sp.	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	cultura , no conjunto dos inimigos.
Couve-flor	Brassica oleracea var. botrytis	-	А	Alternariose	Alternaria brassicae; Alternaria brassicicola	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Couve-lombarda	Brassica oleracea var. sabauda	-	Α	Bacteriose	Pseudomonas sp.; Xanthomonas sp.	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Couve-lombarda	Brassica oleracea var. sabauda	-	А	Estenfiliose	Stemphylium sp.	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Couve-lombarda	Brassica oleracea var. sabauda	-	А	Alternariose	Alternaria brassicae; Alternaria brassicicola	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Couve-repolho	Brassica oleracea var. capitata f. alba	-	А	Bacteriose	Pseudomonas sp.; Xanthomonas sp.	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
Couve-repolho	Brassica oleracea var. capitata f. alba	-	А	Estenfiliose	Stemphylium sp.	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	inimigos.  Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
Couve-repolho	Brassica oleracea var. capitata f. alba	-	A	Alternariose	Alternaria brassicae; Alternaria brassicicola	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	inimigos.  Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
Couve-roxa	Brassica oleracea var. capitata f. rubra	_	A	Estenfiliose	Stemphylium sp.	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	inimigos. Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
Couve-roxa	Brassica oleracea var. capitata f. rubra	_	Α	Bacteriose	Pseudomonas sp.; Xanthomonas sp.	BASF			+	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	inimigos.  Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
	<u> </u>				Alternaria brassicae; Alternaria brassicicola	BASF				a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha		1/-	inimigos. Máximo 6 aplicações por
Couve-roxa	Brassica oleracea var. capitata f. rubra	-		Alternariose					+				0,5 kg/ha		cultura , no conjunto dos inimigos. Máximo 6 aplicações por
Ervilheira	Pisum sativum	-	А	Antracnose	Glomerella cingulata	BASE				Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	cultura , no conjunto dos inimigos. Máximo 6 aplicações por
Ervilheira	Pisum sativum	-	A	Sclerotinia	Sclerotinia sclerotiorum	BASF				Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	cultura , no conjunto dos inimigos . Máximo 6 aplicações por
Ervilheira	Pisum sativum	-	A	Ascoquita	Didymella pisi	BASF		AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	cultura , no conjunto dos inimigos . Máximo até 5 aplicações por
Espinafre	Spinacia oleracea	"Baby leaf" (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A + P	Sclerotinia	Sclerotinia minor	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	5 / - 5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	ciclo cultural, no conjunto dos inimigos  Máximo até 5 aplicações por
Espinafre	Spinacia oleracea	"Baby leaf" (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A + P	Podridão-branca	Sclerotinia sclerotiorum	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	5 / - 5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Espinafre	Spinacia oleracea	"Baby leaf" (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A + P	Podridão-cinzenta	Botrytis cinerea	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	5/-5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Espinafre	Spinacia oleracea	"Baby leaf" (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A + P	Rizoctonia	Thanatephorus solani	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	5 / - 5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Melancia	Citrullus lanatus	-	A	Oídio	Golovinomyces cichoracearum	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Melancia	Citrullus lanatus	-	A + P	Cancro-gomoso	Stagonosporopsis cucurbitacearum	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Melancia	Citrullus lanatus	-	A + P	Rizoctonia	Thanatephorus solani	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
Melancia	Citrullus lanatus	-	Α	Alternariose	Alternaria cucumerina	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	inimigos.  Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
Meloeiro	Cucumis melo	-	A + P	Cancro-gomoso	Stagonosporopsis cucurbitacearum	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	inimigos.  Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
Meloeiro	Cucumis melo	-	A	Oídio	Golovinomyces cichoracearum	BASF				a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	inimigos. Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
Meloeiro	Cucumis melo	_	A + P	Rizoctonia	Thanatephorus solani	BASF			+	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	inimigos. Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
Meloeiro	Cucumis melo	<u>-</u>	Δ	Alternariose	Alternaria cucumerina	BASF				a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6/-5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	inimigos.  Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
Morangueiro	Fragaria x ananassa		A + P	Rizoctonia	Thanatephorus solani	BASF			_	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6/-5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/na 0,5 kg/ha	1/-	inimigos.  Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos
Morangueiro  Morangueiro	Fragaria x ananassa  Fragaria x ananassa	- -	A + P	Murchidão-das-plântulas	Phytophthora sp.	BASF			_	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6/-5	200 - 1000 L/na 200 - 1000 L/ha	0,5 kg/na 0,5 kg/ha	1/-	inimigos. Máximo 6 aplicações por
	-	-							+						cultura , no conjunto dos inimigos . Máximo 6 aplicações por
Morangueiro	Fragaria x ananassa	-	A + P	Podridão-do-colo-e-das-raíze		BASE			+	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	cultura , no conjunto dos inimigos.  Máximo 6 aplicações por cultura no conjunto dos
Morangueiro	Fragaria x ananassa	-	A + P	Oídio	Podosphaera macularis	BASF			+	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	cultura , no conjunto dos inimigos. Máximo 6 aplicações por
Pepino	Cucumis sativus	-	A + P	Oídio	Golovinomyces cichoracearum	BASF				Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	cultura , no conjunto dos inimigos. Máximo 6 aplicações por
Pepino	Cucumis sativus	-	A + P	Rizoctonia	Thanatephorus solani	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	cultura , no conjunto dos inimigos.  Máximo 6 aplicações por
Pepino	Cucumis sativus	-	A + P	Alternariose	Alternaria cucumerina	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	cultura , no conjunto dos inimigos.
Pepino	Cucumis sativus	-	A + P	Cancro-gomoso	Stagonosporopsis cucurbitacearum	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Rúcula	Eruca vesicaria subsp. sativa	"Baby leaf" (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A + P	Podridão-cinzenta	Botrytis cinerea	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	5 / - 5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Rúcula	Eruca vesicaria subsp. sativa	"Baby leaf" (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A + P	Sclerotinia	Sclerotinia minor	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	5/-5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Rúcula	Eruca vesicaria subsp. sativa	"Baby leaf" (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A + P	Podridão-branca	Sclerotinia sclerotiorum	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	5/-5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Rúcula	Eruca vesicaria subsp. sativa	"Baby leaf" (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A + P	Rizoctonia	Thanatephorus solani	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	5/-5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto
Rúcula-selvagem	Diplotaxis tenuifolia	"Baby leaf" (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A + P	Podridão-cinzenta	Botrytis cinerea	BASF	SERIFEL A	AV 12	86 Fungicio	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	5/-5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	dos inimigos  Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto
Rúcula-selvagem	Diplotaxis tenuifolia	"Baby leaf" (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A + P	Sclerotinia	Sclerotinia minor	BASF		AV 12	86 Fungicio	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	5/-5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	dos inimigos Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto
Rúcula-selvagem	Diplotaxis tenuifolia	"Baby leaf" (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A + P	Podridão-branca	Sclerotinia sclerotiorum	BASF				Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	5/-5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	dos inimigos Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto
Rúcula-selvagem	Diplotaxis tenuifolia	"Baby leaf" (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A + P	Rizoctonia	Thanatephorus solani	BASF			+	a Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	5/ - 5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1/-	dos inimigos  Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto
. wow.agem	p. stanto totiulitula	( a.c o o romas veruauellas)		. v.Eddioina		<u></u>	A	12	. ungicio	, , ээм ро мыл ооо	J, - J		s,o ngriid	<u> </u>	dos inimigos