



Systiva®

Suspensão concentrada para o tratamento de sementes (FS) contendo 333 g/L ou 28,7% (p/p) de fluxapirroxade

Fungicida indicado para o controlo da septoriose (*Septoria tritici*) Oídio (*Blumeria graminis*), Ferrugem castanha (*Puccinia recondita*) Ferrugem amarela (*Puccinia striiformis*), Fusariose (*Monographella nivalis*, *Fusarium spp*) Cárie ou fungão (*Tilletia tritici*) do trigo duro e trigo mole. Helmintosporiose (*Pyrenophora teres*), Rincosporiose (*Rhynchosporium secalis*), Oídio (*Blumeria graminis*) Ferrugem castanha (*Puccinia recondita*), Ramularia (*Ramularia collo-cygni*), Carvão (*Ustilago segetum var. nuda*) da cevada. Septoriose (*Septoria tritici*) Oídio (*Blumeria graminis*), Ferrugem castanha (*Puccinia recondita*) Ferrugem amarela (*Puccinia striiformis*), Fusariose (*Monographella nivalis*, *Fusarium spp*) Cárie ou fungão (*Tilletia tritici*) do centeio.

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS
LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO

Autorização provisória de venda nº 1482 concedida pela DGAV

Nº de lote e data de produção, por razões técnicas em outro local do rótulo/embalagem.

Titular da Autorização de Venda:
BASF PORTUGUESA S.A.
Rua 25 de Abril, 1
2689-538 Prior Velho
Telefone: 219499900
Fax: 219499949

200 L

Indicações relativas à sua utilização (incluindo as precauções biológicas)

O **SYSTIVA®** é um fungicida sistémico composto por uma nova substância activa fluxapirroxade, está indicado para o tratamento de sementes de trigo, cevada e centeio, contra as doenças mais importantes, transmissíveis por semente. O fluxapirroxade é uma substância ativa pertencente ao grupo dos pirazóis-carboximidas (inibidor do complexo II, inibindo a enzima sucinato desidrogenase (SDHI)), com mobilidade translaminar, dotada de ação preventiva e curativa. **SYSTIVA®** permite o controlo das principais doenças dos cereais desde a fase da germinação da semente até ao encanamento. Em situações de elevada pressão da doença o tratamento de sementes terá de ser complementado por aplicações foliares

Utilizações, doses, concentrações e épocas e condições de aplicação

O **SYSTIVA®** é um fungicida formulado por forma a que o tratamento de sementes ocorra por via húmida

Cultura	Doenças	Dose
Trigo mole e trigo duro	Septoriose (<i>Septoria tritici</i>) Oídio (<i>Blumeria graminis</i>), Ferrugem castanha (<i>Puccinia recondita</i>) Ferrugem amarela (<i>Puccinia striiformis</i>), Fusariose (<i>Monographella nivalis</i> , <i>Fusarium spp</i>) Cárie ou fungão (<i>Tilletia tritici</i>)	1-1,5L/ton semente
Cevada	Helmintosporiose (<i>Pyrenophora teres</i>), Rincosporiose (<i>Rhynchosporium secalis</i>), Oídio (<i>Blumeria graminis</i>) Ferrugem castanha (<i>Puccinia recondita</i>), Ramularia (<i>Ramularia collo-cygni</i>), Carvão (<i>Ustilago segetum var. nuda</i>)	1,5L/ton semente
Centeio	Septoriose (<i>Septoria tritici</i>) Oídio (<i>Blumeria graminis</i>), Ferrugem castanha (<i>Puccinia recondita</i>) Ferrugem amarela (<i>Puccinia striiformis</i>), Fusariose (<i>Monographella nivalis</i> , <i>Fusarium spp</i>) Cárie ou fungão (<i>Tilletia tritici</i>)	1-1,5L/ton semente

Risco de resistência

Fungicida de risco de resistência que poderá conduzir a quebras de eficácia. A estratégia de utilização indicada nas rubricas anteriores visa impedir que tal aconteça. A BASF não pode ser responsabilizada por alguma perda de eficácia, devida ao desenvolvimento de resistências, resultante duma má utilização do produto, isto é, quando não se sigam as condições de utilização recomendadas (dose, número de tratamentos, sua oportunidade e cadência). Além disso, a BASF não pode ser responsabilizada por alguma perda de eficácia devida ao uso ou armazenagem do produto que não tenham seguido as nossas recomendações.

Modo de preparação da calda

O **SYSTIVA®** é um fungicida formulado por forma a que o tratamento de sementes ocorra por via húmida. Para sementes de trigo duro, trigo mole, centeio, aveia e triticale usar 100-150 mL

Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

Atenção

EUH208 Contém 1,2-benzisotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona. Pode provocar uma reação alérgica.

EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

H317 Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

H362 Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno.

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Indicações de Precaução (Prevenção):

P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

P102 Manter fora do alcance das crianças.

P103 Ler o rótulo antes da utilização.

P260 Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/ aerossóis/ nuvem de pulverização.

P263 Evitar o contato durante a gravidez/o aleitamento.

P264 Lavar com água e sabão cuidadosamente após manuseamento.

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

P272 A roupa de trabalho contaminada não deverá sair do local de trabalho.

P280 Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.

Indicações de Precaução (Resposta):

P302+P352 SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P333+P313 Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.

P362+P364 Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

P391 Recolher produto derramado.

Indicações de Precaução (Eliminação):

P501a Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

SPoPT4 O aplicador deverá usar luvas, vestuário de proteção e proteção ocular durante a preparação da calda; usar luvas, vestuário de proteção, botas de borracha e proteção facial durante a aplicação do produto.

SPoPT6 Após o tratamento lavar bem o material de proteção e os objetos contaminados, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O Centro de Informação Antivenenos, Telef.: 800 250 250

ARMAZENAMENTO: Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

UFI : 2600-J095-U004-KY3N

de SYSTIVA por 100 kg de semente. No tratamento de sementes de cevada utilizar 150 mL de SYSTIVA por 100 kg de semente.

Modo de aplicação

A aplicação deverá fazer-se com máquina adequada que impregne uniformemente toda a semente. Em sistemas de fluxo contínuo, utilizar o produto puro ou diluído em 1:10 em água por 100 kg de semente. Nestes sistemas, é indispensável a prévia calibração da máquina, com o produto uma vez que o fluxo pode variar em função do mesmo.

NOTA

Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



SPPT2 A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado.



4 041885 223937

© = Marca registrada de BASF



81154265 PT 2071