

# Systemiva®

Suspensão concentrada para o tratamento de sementes (FS) contendo 333 g/L ou 28,7% (p/p) de fluxapiróxade

**Fungicida indicado para o controlo da septoriose (*Septoria tritici*) Oídio (*Blumeria graminis*), Ferrugem castanha (*Puccinia recondita*) Ferrugem amarela (*Puccinia striiformis*), Fusariose (*Monographella nivalis*, *Fusarium spp*) Cária ou fungão (*Tilletia tritici*) do trigo duro e trigo mole. Helminthosporiose (*Pyrenophora teres*), Rincosporiose (*Rhynchosporium secalis*), Oídio (*Blumeria graminis*) Ferrugem castanha (*Puccinia recondita*), Ramularia (*Ramularia collo-cygni*), Carvão (*Ustilago segetum var. nuda*) da cevada. Septoriose (*Septoria tritici*) Oídio (*Blumeria graminis*), Ferrugem castanha (*Puccinia recondita*) Ferrugem amarela (*Puccinia striiformis*), Fusariose (*Monographella nivalis*, *Fusarium spp*) Cária ou fungão (*Tilletia tritici*) do centeio.**

**ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISIONAL**

**PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO  
MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS  
LER O RÓTULO ANTES DA UTILIZAÇÃO**

Autorização provisória de venda nº 1482 concedida pela DGAV

Nº de lote e data de produção, por razões técnicas em outro local do rótulo/embalagem.

**Titular da Autorização de Venda:**  
**BASF PORTUGUESA S.A.**

Rua 25 de Abril, 1  
2689-538 Prior Velho  
Telefone: 219499900  
Fax: 219499949

# 200 L

## Indicações relativas à sua utilização (incluindo as precauções biológicas)

O **SYSTEMIVA®** é um fungicida sistémico composto por uma nova substância activa fluxapiróxade, está indicado para o tratamento de sementes de trigo, cevada e centeio, contra as doenças mais importantes, transmissíveis por semente.

O fluxapiróxade é uma substância ativa pertencente ao grupo dos pirazóis-carboximidas (inibidor do complexo II, inibindo a enzima succinato desidrogenase (SDHI)), com mobilidade translaminar, dotada de ação preventiva e curativa.

**SYSTEMIVA®** permite o controlo das principais doenças dos cereais desde a fase da germinação da semente até ao encanamento. Em situações de elevada pressão da doença o tratamento de sementes terá de ser complementado por aplicações foliares permite o controlo das principais doenças dos cereais desde a fase da germinação da semente até ao encanamento. Em situações de elevada pressão da doença o tratamento de sementes terá de ser complementado por aplicações foliares

## Utilizações, doses, concentrações e épocas e condições de aplicação

O **SYSTEMIVA®** é um fungicida formulado por forma a que o tratamento de sementes ocorra por via húmida

Cultura	Doenças	Dose
Trigo mole e trigo duro	Septoriose ( <i>Septoria tritici</i> ) Oídio ( <i>Blumeria graminis</i> ), Ferrugem castanha ( <i>Puccinia recondita</i> ) Ferrugem amarela ( <i>Puccinia striiformis</i> ), Fusariose ( <i>Monographella nivalis</i> , <i>Fusarium spp</i> ) Cária ou fungão ( <i>Tilletia tritici</i> )	1-1,5L/ton semente
Cevada	Helminthosporiose ( <i>Pyrenophora teres</i> ), Rincosporiose ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ), Oídio ( <i>Blumeria graminis</i> ) Ferrugem castanha ( <i>Puccinia recondita</i> ), Ramularia ( <i>Ramularia collo-cygni</i> ), Carvão ( <i>Ustilago segetum var. nuda</i> )	1,5L/ton semente
Centeio	Septoriose ( <i>Septoria tritici</i> ) Oídio ( <i>Blumeria graminis</i> ), Ferrugem castanha ( <i>Puccinia recondita</i> ) Ferrugem amarela ( <i>Puccinia striiformis</i> ), Fusariose ( <i>Monographella nivalis</i> , <i>Fusarium spp</i> ) Cária ou fungão ( <i>Tilletia tritici</i> )	1-1,5L/ton semente

## Risco de resistência

Fungicida de risco de resistência que poderá conduzir a quebras de eficácia. A estratégia de utilização indicada nas rubricas anteriores visa impedir que tal aconteça. A BASF não pode ser responsabilizada por alguma perda de eficácia, devida ao desenvolvimento de resistências, resultante duma má utilização do produto, isto é, quando não se sigam as condições de utilização recomendadas (dose, número de tratamentos, sua oportunidade e cadência). Além disso, a BASF não pode ser responsabilizada por alguma perda de eficácia devida ao uso ou armazenagem do produto que não tenham seguido as nossas recomendações.

## Modo de preparação da calda

O **SYSTEMIVA®** é um fungicida formulado por forma a que o tratamento de sementes ocorra por via húmida. Para sementes de trigo duro, trigo mole, centeio, aveia e triticales usar 100-150 mL de SYSTEMIVA por 100 kg de semente. No tratamento de sementes de cevada utilizar 150 mL de SYSTEMIVA por 100 kg de semente.

## Modo de aplicação

A aplicação deverá fazer-se com máquina adequada que impregne uniformemente toda a semente. Em sistemas de fluxo contínuo, utilizar o produto puro ou diluído em 1:10 em água por 100 kg de semente. Nestes sistemas, é indispensável a prévia calibração da máquina, com o produto uma vez que o fluxo pode variar em função do mesmo.

## Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

### Atenção

**EUH208** Contém 1,2-benzisotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona. Pode provocar uma reação alérgica.

**EUH210** Ficha de segurança fornecida a pedido.

**H362** Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno.

**H410** Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

### Indicações de Precaução (Prevenção):

**P101** Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.

**P201** Pedir instruções específicas antes da utilização.

**P260** Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis/nuvem de pulverização.

**P263** Evitar o contato durante a gravidez/o aleitamento.

**P270** Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.

### Indicações de Precaução (Resposta):

**P308+P311** EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

**P391** Recolher produto derramado.

### Indicações de Precaução (Eliminação):

**P501a** Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

**SP1** Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.

**SPoPT4** O aplicador deverá usar luvas, vestuário de proteção e proteção ocular durante a preparação da calda; usar luvas, vestuário de proteção, botas de borracha e proteção facial durante a aplicação do produto.

**SPoPT6** Após o tratamento lavar bem o material de proteção e os objetos contaminados, tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.

**EM CASO DE INTOXICAÇÃO CONTACTAR O Centro de Informação Antivenenos, Telef.: 800 250 250**

## NOTA

Os resultados da aplicação deste produto são susceptíveis de variar pela acção de factores que estão fora do nosso domínio, pelo que apenas nos responsabilizamos pelas características previstas na Lei.



**SP22** A embalagem vazia não deverá ser lavada, sendo completamente esgotada do seu conteúdo, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, sempre que possível, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado.



4 04 1885 223937

