

EXTENÇÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MELHORES (a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações melhores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	Ar Livre / Protegida / Interior	Inimigo / Efeito a evitar	Nome Científico	Requerente do UM	Designação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/Intervalo (mín- máx) (dias)	Volume de Cálida (mín- máx)	Dose (mín-máx)	I. de Segurança/ de Reentrada (dias)	Cond. e Restrições Específicas
Couve-de-Pekim	<i>Brassica napus subsp. pekinensis</i>	-	A	Traça-da-couve	<i>Plutella xylostella</i>	Frupor S.A.	ALVERDE	AV	1987	Inseticida/ acaricida	metaflumizona	Primeiros instares de desenvolvimento da praga (BBCH 30-49)	2 / 7 - 10	500 - 1000 L/ha	1 L/ha	7 / -	Máximo 2 aplicações por ciclo cultural com produtos contendo metaflumizona. Não são permitidas aplicações manuais.
Couve-de-Pekim	<i>Brassica napus subsp. pekinensis</i>	-	A	Traça-da-couve	<i>Plutella xylostella</i>	-	ALVERDE	AV	1987	Inseticida/ acaricida	metaflumizona	Primeiros instares de desenvolvimento da praga	2 / 7 - 10	500 - 1000 L/ha	1 L/ha	3 / -	-
Hortelã-pimenta	<i>Mentha x piperita</i>	consumo de folha (planta aromática)	A	Alternaríose	<i>Alternaria sp.</i>	-	ALVERDE	AV	1987	Inseticida/ acaricida	metaflumizona	Primeiros instares de desenvolvimento da praga	2 / 7 - 10	500 - 1000 L/ha	1 L/ha	3 / -	-
Feno-grego (=fenacho)	<i>Foeniculum officinale</i>	consumo de folha (planta aromática fresca)	A	Alternaríose	<i>Alternaria sp.</i>	-	ALVERDE	AV	1987	Inseticida/ acaricida	metaflumizona	Primeiros instares de desenvolvimento da praga	2 / 7 - 10	500 - 1000 L/ha	1 L/ha	3 / -	-
Cebolinho	<i>Allium schoenoprasum</i>	consumo de folha (planta aromática fresca)	A	Alternaríose	<i>Alternaria sp.</i>	-	ALVERDE	AV	1987	Inseticida/ acaricida	metaflumizona	Primeiros instares de desenvolvimento da praga	2 / 7 - 10	500 - 1000 L/ha	1 L/ha	3 / -	-
Alecrim	<i>Rosmarinus officinalis</i>	consumo de folha (planta aromática fresca)	A	Alternaríose	<i>Alternaria sp.</i>	-	ALVERDE	AV	1987	Inseticida/ acaricida	metaflumizona	Primeiros instares de desenvolvimento da praga	2 / 7 - 10	500 - 1000 L/ha	1 L/ha	3 / -	-
Aneto (=endro)	<i>Anethum graveolens</i>	consumo de folha (planta aromática fresca)	A	Alternaríose	<i>Alternaria sp.</i>	-	ALVERDE	AV	1987	Inseticida/ acaricida	metaflumizona	Primeiros instares de desenvolvimento da praga	2 / 7 - 10	500 - 1000 L/ha	1 L/ha	3 / -	-
Hortelã-comum	<i>Mentha spicata</i>	consumo de folha (planta aromática fresca)	A	Alternaríose	<i>Alternaria sp.</i>	Frupor S.A. Apartado 2, E.C. São Teotónio, 7631-908 São Teotónio, Portugal	ALVERDE	AV	1987	Inseticida/ acaricida	metaflumizona	Primeiros instares de desenvolvimento da praga (BBCH 30-49)	2 / 7 - 10	500 - 1000 L/ha	1 L/ha	7 / -	Máximo 2 aplicações por ciclo cultural com produtos contendo metaflumizona. Não são permitidas aplicações manuais.