

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MELIORES (a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações melhores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	Ar Livre / Protegida / Interior	Inimigo / Efeito a evitar	Nome Científico	Requerente do UM	Designação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/Intervalo (mínimo) (dias)	Volume de Cálida (mínimo)	Dose (mínimo)	I. de Segurança/ de Reentrada (dias)	Cond. e Restrições Específicas
Soja	<i>Glycine max</i>	-	A	Infestantes dicotiledóneas e ciperáceas	-		BASAGRAN	AV	0030	Herbicida	bertrazona (na forma de sal de sódio)	Aplicar em pós-emergência da cultura, entre 1-3 folhas (BBCH 11-13).	1 / -	100 - 400 -	2 L/ha	* / -	* Intervalo de segurança coberto pela época de aplicação do produto (com a cultura até às 3 folhas). Aplicar quando as infestantes se encontram em crescimento ativo, de preferência nos primeiros estados de desenvolvimento.
Faveira	<i>Vicia faba</i>	Consumo em seco (leguminosa seca)	A	Infestantes dicotiledóneas e ciperáceas	-		BASAGRAN	AV	0030	Herbicida	bertrazona (na forma de sal de sódio)	Aplicar em pós-emergência da cultura, a partir do estado de 5-6 folhas até às 9 folhas (BBCH 15/16-19).	1 / -	100 - 400 -	2 L/ha	* / -	* Intervalo de segurança coberto pela época de aplicação do produto (com a cultura até às 9 folhas). Aplicar quando as infestantes se encontram em crescimento ativo, de preferência nos primeiros estados de desenvolvimento.
Faveira	<i>Vicia faba</i>	Consumo em fresco (produção de grão)	A	Infestantes dicotiledóneas e ciperáceas	-	CAMPOSOL II, Lda Herdade dos Nascidos, EN 393, KM 6, APT 123, 7645-909 Vila Nova de Milfontes	BASAGRAN	AV	0030	Herbicida	bertrazona (na forma de sal de sódio)	Aplicar em pós-emergência da cultura, a partir do estado de 5-6 folhas até às 9 folhas (BBCH 15-16).	1 / -	100 - 400 -	2 L/ha	* / -	* Intervalo de segurança coberto pela época de aplicação do produto (com a cultura até às 9 folhas). Aplicar quando as infestantes se encontram em crescimento ativo, de preferência nos primeiros estados de desenvolvimento.