

## EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MENORES

CULTURA	ORGANISMO NOCIVO	CONCENTRAÇÃO OU DOSE	VOLUME DE CALDA	Nº MÁXIMO DE tratamentos	I. S. (dias)	MARCA COMERCIAL	SUBSTÂNCIA ATIVA	FUNÇÃO	EMPRESA	AUTORIZAÇÃO DE VENDA (APV/AV Nº)	REQUERENTE	DATA DE CONCESSÃO	Observações
RELVADOS (campos de golfe)	antracnose ( <i>Colletotrichum graminicola</i> )	1-1,5Kg p.c./ha	400-600L/ha	Máximo 2 tratamentos/ano com este p.c. ou outros fungicidas contendo Qol - Máximo de fungicidas com SDHI (3)	- (ar livre)	BELLIS	boscalide + piraclostrobina	FU	BASF PORTUGUESA, S. A.	195	APG - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE GREENKEEPERS	17/06/2015	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas SPe3 = 10m
RELVADOS (campos de golfe)	esclerotinia ( <i>Sclerotinia homoeocarpa</i> )	1-1,5Kg p.c./ha	400-600L/ha	Máximo 2 tratamentos/ano com este p.c. ou outros fungicidas contendo Qol - Máximo de fungicidas com SDHI (3)	- (ar livre)	BELLIS	boscalide + piraclostrobina	FU	BASF PORTUGUESA, S. A.	195	APG - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE GREENKEEPERS	17/06/2015	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas SPe3 = 10m
RELVADOS (campos de golfe)	furariose ( <i>Monographella nivalis</i> ( <i>Fusarium nivale</i> ))	1-1,5Kg p.c./ha	400-600L/ha	Máximo 2 tratamentos/ano com este p.c. ou outros fungicidas contendo Qol - Máximo de fungicidas com SDHI (3)	- (ar livre)	BELLIS	boscalide + piraclostrobina	FU	BASF PORTUGUESA, S. A.	195	APG - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE GREENKEEPERS	17/06/2015	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas SPe3 = 10m
RELVADOS (campos de golfe)	rizoctonia ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	1-1,5Kg p.c./ha	400-600L/ha	Máximo 2 tratamentos/ano com este p.c. ou outros fungicidas contendo Qol - Máximo de fungicidas com SDHI (3)	- (ar livre)	BELLIS	boscalide + piraclostrobina	FU	BASF PORTUGUESA, S. A.	195	APG - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE GREENKEEPERS	17/06/2015	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas SPe3 = 10m
RELVADOS (produção de tapetes de relva)	antracnose ( <i>Colletotrichum graminicola</i> )	1-1,5Kg p.c./ha	400-600L/ha	Máximo 2 tratamentos/ano com este p.c. ou outros fungicidas contendo Qol - Máximo de fungicidas com SDHI (3)	- (ar livre)	BELLIS	boscalide + piraclostrobina	FU	BASF PORTUGUESA, S. A.	195	VASVERDE SOCIEDADE AGRICOLA UNIPessoal LDA.	08/02/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas SPe3 = 10m
RELVADOS (produção de tapetes de relva)	esclerotinia ( <i>Sclerotinia homoeocarpa</i> )	1-1,5Kg p.c./ha	400-600L/ha	Máximo 2 tratamentos/ano com este p.c. ou outros fungicidas contendo Qol - Máximo de fungicidas com SDHI (3)	- (ar livre)	BELLIS	boscalide + piraclostrobina	FU	BASF PORTUGUESA, S. A.	195	VASVERDE SOCIEDADE AGRICOLA UNIPessoal LDA.	09/02/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas SPe3 = 10m
RELVADOS (produção de tapetes de relva)	furariose ( <i>Monographella nivalis</i> ( <i>Fusarium nivale</i> ))	1-1,5Kg p.c./ha	400-600L/ha	Máximo 2 tratamentos/ano com este p.c. ou outros fungicidas contendo Qol - Máximo de fungicidas com SDHI (3)	- (ar livre)	BELLIS	boscalide + piraclostrobina	FU	BASF PORTUGUESA, S. A.	195	VASVERDE SOCIEDADE AGRICOLA UNIPessoal LDA.	10/02/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas SPe3 = 10m
RELVADOS (produção de tapetes de relva)	rizoctonia ( <i>Rhizoctonia solani</i> )	1-1,5Kg p.c./ha	400-600L/ha	Máximo 2 tratamentos/ano com este p.c. ou outros fungicidas contendo Qol - Máximo de fungicidas com SDHI (3)	- (ar livre)	BELLIS	boscalide + piraclostrobina	FU	BASF PORTUGUESA, S. A.	195	VASVERDE SOCIEDADE AGRICOLA UNIPessoal LDA.	11/02/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas SPe3 = 10m