

## EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MENORES

CULTURA	ORGANISMO NOCIVO	CONCENTRAÇÃO OU DOSE	VOLUME DE CALDA	Nº MÁXIMO DE tratamentos	I. S. (dias)	MARCA COMERCIAL	SUBSTÂNCIA ATIVA	FUNÇÃO	EMPRESA	AUTORIZAÇÃO DE VENDA APV/(AV Nº)	REQUERENTE	DATA DE CONCESSÃO	Observações
ALHO PORRO ( <i>Allium porrum</i> L.)	mono e dicotiledóneas anuais	1,5 - 2,5 L p.c./há			-	BUTISAN S	metazacloiro	HB	BASF PORTUGUESA, S.A.	3939	AIHO	07/09/2009	
COLZA ( <i>Brassica napus</i> L. var <i>oleifera</i> )	infestantes	1,5 - 2L p.c./ha	200 - 400L/ha	Máximo 1 aplicação com este p.c.	-	BUTISAN S	metazacloiro	HB	BASF PORTUGUESA, S.A.	3939	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BEJA E BRINCHES, C.R.L.	16/10/2014	
COUVE FRISADA ( <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>acephala</i> ; <i>Brassica oleracea</i> var. <i>costata</i> ) couve galega e couve portuguesa	mono e dicotiledóneas anuais	1,5 - 2,5 L p.c./ha			70	BUTISAN S	metazacloiro	HB	BASF PORTUGUESA, S.A.	3939	AIHO	18/01/2010	
COUVE ROXA	infestantes (mono e dicotiledóneas)	1,5 - 2,5 L p.c./há			70	BUTISAN S	metazacloiro	HB	BASF PORTUGUESA, S.A.	3939	AIHO	22/04/2009	
COUVE-BRÓCOLO ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i> )	mono e dicotiledóneas anuais	1,5 - 2 L p.c./há			70	BUTISAN S	metazacloiro	HB	BASF PORTUGUESA, S.A.	3939	AIHO	08/04/2009	SPe3= 5 metros ou em alternativa, utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos 50% de redução no arrastamento da calda
COUVE-FLOR ( <i>Brassica oleracea</i> var. <i>subvar botrytis</i> )	mono e dicotiledóneas anuais	1,5 - 2 L p.c./há			70	BUTISAN S	metazacloiro	HB	BASF PORTUGUESA, S.A.	3939	AIHO	08/04/2009	SPe3= 5 metros ou em alternativa, utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos 50% de redução no arrastamento da calda
NABO ( <i>Brassica rapa</i> var <i>rapa</i> )	mono e dicotiledóneas anuais	1,5 - 2,5 L p.c./ha			70	BUTISAN S	metazacloiro	HB	BASF PORTUGUESA, S.A.	3939	AIHO	22/04/2009	