

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MELHORES (a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações melhores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	Ar Livre / Protegida / Interior	Inimigo / Efeito a evitar	Nome Científico	Requerente do UM	Designação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/Intervalo (mín- máx) (dias)	Volume de Cálida (mín- máx)	Dose (mín-máx)	L de Segurança/ de Reentrada (dias)	Cond. e Restrições Específicas
Alio-porro (salho-francês)	<i>Allium porrum</i>	-	A	Infestantes mono e dicotiledóneas anuais	-	-	BUTISAN S	AV	2023	Herbicida	metazadoro	Pós-transplantação da cultura (BSCCH 14-16), com as plantas enraizadas. Pré-emergência das infestantes ou pós-emergência numa fase muito inicial do desenvolvimento.	1 / -	100 - 400 L/ha	1,5 L/ha	- / -	-
Nabo	<i>Brassica rapa</i>	-	A	Infestantes mono e dicotiledóneas anuais	-	-	BUTISAN S	AV	2023	Herbicida	metazadoro	Pré-emergência da cultura (BSCCH 00-09) e pré-emergência das infestantes ou pós-emergência numa fase muito inicial do desenvolvimento.	1 / -	100 - 400 L/ha	1,5 L/ha	- / -	-
Nabo	<i>Brassica rapa</i>	-	A	Infestantes mono e dicotiledóneas anuais	-	-	BUTISAN S	AV	2023	Herbicida	metazadoro	Pós-transplantação da cultura (BSCCH 14-16), com as plantas enraizadas. Pré-emergência das infestantes ou pós-emergência numa fase muito inicial do desenvolvimento.	1 / -	100 - 400 L/ha	1,5 - 2 L/ha	- / -	-
Cogumelos	<i>Agaricus bisporus</i>	cogumelos cultivados	P	Oídio	<i>Hymomyces rosellus</i>	-	BUTISAN S	AV	2023	Herbicida	metazadoro	Pós-transplantação da cultura (BSCCH 14-16), com as plantas enraizadas. Pré-emergência das infestantes ou pós-emergência numa fase muito inicial do desenvolvimento.	1 / -	100 - 400 L/ha	1,5 - 2 L/ha	- / -	-