

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MENORES

CULTURA	ORGANISMO NOCIVO	CONCENTRAÇÃO OU DOSE	VOLUME DE CALDA	Nº MÁXIMO DE tratamentos	I. S. (dias)	MARCA COMERCIAL	SUBSTÂNCIA ATIVA	FUNÇÃO	EMPRESA	AUTORIZAÇÃO DE VENDA APV/AV Nº1	REQUERENTE	DATA DE CONCESSÃO	Observações
Tangerineira (<i>Citrus reticulata</i>)	Alternariose (<i>Alternaria sp</i>)	1,125 g p.c./hL	1000 - 1500L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, o número máximo de tratamentos por ciclo cultural e no conjunto das doenças é de 4 com este fungicida ou outros QoI. Alternar com fungicidas com modos de ação diferentes.	21	CABRIO WG	piraclostrobina (QoI)	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1138	BASF	19/09/2019	Iniciar os tratamentos no outono quando se verificar um abaixamento de temperatura e surjam as primeiras chuvas, prosseguir os tratamentos enquanto o tempo decorra frio e húmido. BBCH 31 - 85. O produto possui uma persistência biológica de 14 dias SPe3
Limoeiro (<i>Citrus limon</i>)	Alternariose (<i>Alternaria sp</i>)	1,125 g p.c./hL	1000 - 1500L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, o número máximo de tratamentos por ciclo cultural e no conjunto das doenças é de 4 com este fungicida ou outros QoI. Alternar com fungicidas com modos de ação diferentes.	21	CABRIO WG	piraclostrobina (QoI)	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1138	BASF	19/09/2019	Iniciar os tratamentos no outono quando se verificar um abaixamento de temperatura e surjam as primeiras chuvas, prosseguir os tratamentos enquanto o tempo decorra frio e húmido. BBCH 31 - 85. O produto possui uma persistência biológica de 14 dias SPe3