

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MELHORES (a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações melhores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	Ar Livre / Protegida / Interior	Inimigo / Efeito a evitar	Nome Científico	Requerimento do UH	Designação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ative(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/Intervalo (mínimo) (dias)	Volume de Cálculo (mínimo)	Dose (mínimo)	L de Segurança/ de Reentrada (dias)	Cond. e Restrições Específicas
Coentros	<i>Coriandrum sativum</i>	-	A+P	Alternaria	Alternaria	Cooperativa Agrícola de Loures - Rua do Funchal, n.º 45. Funguero. 2670-364 Loures	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + praxistrobina	Realizar os tratamentos, ao aparecimento dos primeiros sintomas se as condições forem favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	2 - 25 L/ha	7 / -	Realizar no máximo 2 aplicações por ciclo cultural, com este ou outro QdI.
Salsa	<i>Petroselinum crispum</i>	-	A+P	Alternaria	Alternaria	Cooperativa Agrícola de Loures - Rua do Funchal, n.º 45. Funguero. 2670-364 Loures	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + praxistrobina	Realizar os tratamentos, ao aparecimento dos primeiros sintomas se as condições forem favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	2 - 25 L/ha	7 / -	Realizar no máximo 2 aplicações por ciclo cultural, com este ou outro QdI.
Nabo	<i>Brassica napae</i>	Nabiça	A	Mídio	<i>Peronospora parasitica</i>	Cooperativa Agrícola de Loures - Rua do Funchal, n.º 45. Funguero. 2670-364 Loures	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + praxistrobina	Realizar os tratamentos, ao aparecimento dos primeiros sintomas se as condições forem favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso)	2 / 7 - 10	300 - 1000 L/ha	2 - 25 L/ha	14 / -	Realizar no máximo 2 aplicações por ciclo cultural, com este ou outro QdI.
Nabo	<i>Brassica napae</i>	Nabo de grelo	A	Mídio	<i>Peronospora parasitica</i>	Cooperativa Agrícola de Loures - Rua do Funchal, n.º 45. Funguero. 2670-364 Loures	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + praxistrobina	Realizar os tratamentos, ao aparecimento dos primeiros sintomas se as condições forem favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso)	2 / 7 - 10	300 - 1000 L/ha	2 - 25 L/ha	14 / -	Realizar no máximo 2 aplicações por ciclo cultural, com este ou outro QdI.
Espinafre	<i>Spinacia oleracea</i>	-	A	Mídio	<i>Peronospora spinaciae</i>	Cooperativa Agrícola de Loures - Rua do Funchal, n.º 45. Funguero. 2670-364 Loures	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + praxistrobina	Realizar os tratamentos, ao aparecimento dos primeiros sintomas se as condições forem favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso)	2 / 7 - 10	300 - 1000 L/ha	2 - 25 L/ha	14 / -	Realizar no máximo 2 aplicações por ciclo cultural, com este ou outro QdI. Consultar a indústria transformadora antes de usar o produto no espinafre cuja produção se destina a transformação industrial.
Espinafre	<i>Spinacia oleracea</i>	Baby-leaf   GRUPO II	A+P	Mídio	<i>Peronospora spinaciae</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + praxistrobina	BBCH 10-17; tratar em condições favoráveis ao aparecimento da doença (tempo húmido e chuvoso)	2 / 7 - 10	300 - 1000 L/ha	2 - 25 L/ha	14 / -	Utilizar o intervalo mais curto (7 dias) e a dose mais elevada (2,5 L/ha) em condições de maior pressão da doença. Realizar no máximo 2 aplicações por ciclo cultural (conjunto das doenças), com este ou outro QdI. O CABRIO DUO contém também dimetomorfe, fungicida do grupo CAA, respetar ainda o número máximo de tratamentos admitidos para cada cultura com CAA. Este fungicida deverá ser utilizado em alternância com fungicidas de diferente modo de ação.
Alface	<i>Lactuca sativa</i>	(baby-leaf) grupo II	A+P	Mídio	<i>Bremia lactucae</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + praxistrobina	BBCH 10-17; tratar em condições favoráveis ao aparecimento da doença (tempo húmido e chuvoso)	2 / 7 - 10	300 - 1000 L/ha	2 - 25 L/ha	14 / -	Utilizar o intervalo mais curto (7 dias) e a dose mais elevada (2,5 L/ha) em condições de maior pressão da doença. Realizar no máximo 2 aplicações por ciclo cultural (conjunto das doenças), com este ou outro QdI. O CABRIO DUO contém também dimetomorfe, fungicida do grupo CAA, respetar ainda o número máximo de tratamentos admitidos para cada cultura com CAA. Este fungicida deverá ser utilizado em alternância com fungicidas de diferente modo de ação.
Couve-brócolo	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	-	A	Mídio	<i>Peronospora parasitica</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + praxistrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1,5 - 2,5 L/ha	7 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.
Couve-flor	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>	-	A	Mídio	<i>Peronospora parasitica</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + praxistrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1,5 - 2,5 L/ha	7 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.
Couve-lombarda	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>sabauda</i>	-	A	Mídio	<i>Peronospora parasitica</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + praxistrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1,5 - 2,5 L/ha	3 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.
Couve-coração	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata f. conica</i>	-	A	Mídio	<i>Peronospora parasitica</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + praxistrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1,5 - 2,5 L/ha	3 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.
Couve-repolho	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata f. alba</i>	-	A	Mídio	<i>Peronospora parasitica</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + praxistrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1,5 - 2,5 L/ha	3 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MENORES (a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	Ar Livre / Protegida / Interior	Inimigo / Efeito alérgico	Nome Científico	Requerente do UM	Designação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/Intervalo (mín-máx) (dias)	Volume de Cálculo (mín-máx)	Dose (mín-máx)	L de Segurança/ de Reentrada (dias)	Cond. e Restrições Específicas
Couve-rosa	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata f. rubra</i>	-	A	Mídio	<i>Peronospora parasitica</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + piraclostrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuva).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1,5 - 2,5 L/ha	3 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.
Couve-chinesa	<i>Brassica oleracea</i> subsp. <i>Chinensis</i>	-	A	Mídio	<i>Peronospora parasitica</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + piraclostrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuva).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1,5 - 2,5 L/ha	14 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.
Couve-brócolo	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	-	A	Alternarrose	<i>Alternaria brassicae</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + piraclostrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuva).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1,5 - 2,5 L/ha	7 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.
Couve-Flor	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>	-	A	Alternarrose	<i>Alternaria brassicae</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + piraclostrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuva).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1,5 - 2,5 L/ha	7 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.
Couve-lombarda	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>sabauda</i>	-	A	Alternarrose	<i>Alternaria brassicae</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + piraclostrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuva).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1,5 - 2,5 L/ha	3 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.
Couve-coração	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata f. conica</i>	-	A	Alternarrose	<i>Alternaria brassicae</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + piraclostrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuva).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1,5 - 2,5 L/ha	3 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.
Couve-repolho	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata f. alba</i>	-	A	Alternarrose	<i>Alternaria brassicae</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + piraclostrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuva).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1,5 - 2,5 L/ha	3 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.
Couve-rosa	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata f. rubra</i>	-	A	Alternarrose	<i>Alternaria brassicae</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + piraclostrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuva).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1,5 - 2,5 L/ha	3 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.
Couve-chinesa	<i>Brassica oleracea</i> subsp. <i>Chinensis</i>	-	A	Alternarrose	<i>Alternaria brassicae</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + piraclostrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuva).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1,5 - 2,5 L/ha	14 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.
Couve-brócolo	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	-	A	Mancha-das-folhas	<i>Mycosphaella brassicola</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + piraclostrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuva).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1,5 - 2,5 L/ha	7 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.
Couve-Flor	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>	-	A	Mancha-das-folhas	<i>Mycosphaella brassicola</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + piraclostrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuva).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1,5 - 2,5 L/ha	7 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.
Couve-lombarda	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>sabauda</i>	-	A	Mancha-das-folhas	<i>Mycosphaella brassicola</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + piraclostrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuva).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1,5 - 2,5 L/ha	3 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.
Couve-coração	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata f. conica</i>	-	A	Mancha-das-folhas	<i>Mycosphaella brassicola</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + piraclostrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuva).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1,5 - 2,5 L/ha	3 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MENORES (a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	Ar Livre / Protegida / Interior	Inimigo / Efeito alérgico	Nome Científico	Requerente do UM	Designação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/Intervalo (mín- máx) (dias)	Volume de Cálculo (mín- máx)	Dose (mín-máx)	L de Segurança/ de Reentrada (dias)	Cond. e Restrições Específicas
Couve-repolho	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata f. alba</i>	-	A	Mancha-das-folhas	<i>Mycosphaella brassicola</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorf + praxostrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1.5 - 2.5 L/ha	3 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.
Couve-roxa	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata f. rubra</i>	-	A	Mancha-das-folhas	<i>Mycosphaella brassicola</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorf + praxostrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1.5 - 2.5 L/ha	3 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.
Couve-chinesa	<i>Brassica napa</i> subsp. <i>Chinensis</i>	-	A	Mancha-das-folhas	<i>Mycosphaella brassicola</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorf + praxostrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1.5 - 2.5 L/ha	14 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.
Couve-de-Pequim	<i>Brassica napa</i> subsp. <i>pekinensis</i>	-	A	Mídio	<i>Pteronospora parasitica</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorf + praxostrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1.5 - 2.5 L/ha	14 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.
Couve-de-Pequim	<i>Brassica napa</i> subsp. <i>pekinensis</i>	-	A	Alternariose	<i>Alternaria brassicae</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorf + praxostrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1.5 - 2.5 L/ha	14 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.
Couve-de-Pequim	<i>Brassica napa</i> subsp. <i>pekinensis</i>	-	A	Mancha-das-folhas	<i>Mycosphaella brassicola</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorf + praxostrobina	BBCH 10 - 49. Tratar de acordo com o serviço de avisos agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso).	2 / 10 - 12	300 - 1000 L/ha	1.5 - 2.5 L/ha	14 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 2 tratamentos por campanha, no conjunto das doenças, com este fungicida ou com outro que contenha QdI. Não aplicar Cabrio Duo em couve destinada a processamento.
Hortelã-pimenta	<i>Mentha x piperita</i>	consumo de folha (planta aromática)	A	Alternariose	<i>Alternaria sp.</i>	QFLDA	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorf + praxostrobina	Realizar tratamentos ao aparecimento dos primeiros sintomas se as condições forem favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso).	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	2 - 2.5 L/ha	7 / -	Utilizar o intervalo mais   curto (7 dias) e a dose mais elevada (2.5 L/ha) em condições de maior   pressão da doença.   Realizar no máximo 2   aplicações por ciclo cultural   (conjunto das doenças),   com este ou outro QdI.
Feno-grego (f-enacho)	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	consumo de folha (planta aromática fresca)	A	Alternariose	<i>Alternaria sp.</i>	QFLDA	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorf + praxostrobina	Realizar tratamentos ao aparecimento dos primeiros sintomas se as condições forem favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso).	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	2 - 2.5 L/ha	7 / -	Utilizar o intervalo mais   curto (7 dias) e a dose mais   elevada (2.5 L/ha) em   condições de maior   pressão da doença.   Realizar no máximo 2   aplicações por ciclo cultural   (conjunto das doenças),   com este ou outro QdI.
Cebolinho	<i>Allium schoenoprasum</i>	consumo de folha (planta aromática fresca)	A	Alternariose	<i>Alternaria sp.</i>	QFLDA	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorf + praxostrobina	Realizar tratamentos ao aparecimento dos primeiros sintomas se as condições forem favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso).	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	2 - 2.5 L/ha	7 / -	Utilizar o intervalo mais   curto (7 dias) e a dose mais   elevada (2.5 L/ha) em   condições de maior   pressão da doença.   Realizar no máximo 2   aplicações por ciclo cultural   (conjunto das doenças),   com este ou outro QdI.
Alecrim	<i>Rosmarinus officinalis</i>	consumo de folha (planta aromática fresca)	A	Alternariose	<i>Alternaria sp.</i>	QFLDA	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorf + praxostrobina	Realizar tratamentos ao aparecimento dos primeiros sintomas se as condições forem favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso).	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	2 - 2.5 L/ha	7 / -	Utilizar o intervalo mais   curto (7 dias) e a dose mais   elevada (2.5 L/ha) em   condições de maior   pressão da doença.   Realizar no máximo 2   aplicações por ciclo cultural   (conjunto das doenças),   com este ou outro QdI.
Aneto (=endro)	<i>Anethum graveolens</i>	consumo de folha (planta aromática fresca)	A	Alternariose	<i>Alternaria sp.</i>	QFLDA	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorf + praxostrobina	Realizar os tratamentos ao aparecimento dos primeiros sintomas se as condições forem favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso).	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	2 - 2.5 L/ha	7 / -	Utilizar o intervalo mais   curto (7 dias) e a dose mais   elevada (2.5 L/ha) em   condições de maior   pressão da doença.   Realizar no máximo 2   aplicações por ciclo cultural   (conjunto das doenças),   com este ou outro QdI.
Hortelã-comum	<i>Mentha spicata</i>	consumo de folha (planta aromática fresca)	A	Alternariose	<i>Alternaria sp.</i>	QFLDA	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorf + praxostrobina	Realizar tratamentos ao aparecimento dos primeiros sintomas se as condições forem favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso).	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	2 - 2.5 L/ha	7 / -	Utilizar o intervalo mais   curto (7 dias) e a dose mais   elevada (2.5 L/ha) em   condições de maior   pressão da doença.   Realizar no máximo 2   aplicações por ciclo cultural   (conjunto das doenças),   com este ou outro QdI.
Ervilheira	<i>Pisum sativum</i>	Consumo em fresco (grão)	A	Mídio	<i>Pteronospora viciae</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorf + praxostrobina	Realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso). BBCH 10-49	2 / 7 - 10		2 - 2.5 L/ha	21 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou outro contendo QdIs em mais de 2 tratamentos por ano. Alternar com outros fungicidas com modos de ação diferentes.
Faveira	<i>Vicia faba</i>	Consumo em fresco (grão)	A	Mídio	<i>Pteronospora viciae</i>	BASF	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorf + praxostrobina	Realizar os tratamentos sempre que as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso). BBCH 10-49	2 / 7 - 10		2 - 2.5 L/ha	21 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou outro contendo QdIs em mais de 2 tratamentos por ano. Alternar com outros fungicidas com modos de ação diferentes.

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MENORES (a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	Ar Livre / Protegida / Interior	Inimigo / Efeito e alérgico	Nome Científico	Requerente do UM	Designação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/Intervalo (min-máx) (dias)	Volume de Cálida (min-máx)	Dose (min-máx)	L de Segurança/ de Reentrada (dias)	Cond. e Restrições Específicas
Ervilheira	<i>Pisum sativum</i>	Consumo em fresco (grão)	A	Moldo	<i>Pterospora viciae</i>	QFLDA	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + piraclostrobina	Realizar tratamentos ao aparecimento dos primeiros sintomas se as condições forem favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	2 - 2.5 L/ha	7 / -	Utilizar o intervalo mais   curto (7 dias) e a dose mais elevada (2.5 L/ha) em condições de maior   pressão da doença.   Realizar no máximo 2   aplicações por ciclo cultural.   (conjunto das doenças).   com este ou outro QoI.
Faveira	<i>Vicia faba</i>	Consumo em fresco (grão)	A	Moldo	<i>Pterospora viciae</i>	QFLDA	CABRIO DUO	AV	0196	Fungicida	dimetomorfe + piraclostrobina	Realizar tratamentos ao aparecimento dos primeiros sintomas se as condições forem favoráveis ao desenvolvimento da doença (tempo húmido e chuvoso)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	2 - 2.5 L/ha	7 / -	Utilizar o intervalo mais   curto (7 dias) e a dose mais   elevada (2.5 L/ha) em   condições de maior   pressão da doença.   Realizar no máximo 2   aplicações por ciclo cultural.   (conjunto das doenças).   com este ou outro QoI.