

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MELHORES (a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações melhores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	Ar Livre / Protegida / Interior	Inimigo / Efeito a evitar	Nome Científico	Requerente do UM	Designação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/Intervalo (mín- máx) (dias)	Volume de Cálida (mín- máx)	Dose (mín-máx)	L de Segurança/ de Reentrada (dias)	Condi. e Restrições Específicas
Tangerina (inclui Clementina e híbridos)	<i>Citrus reticulata</i>	-	A	Alternarize	Alternarize	BASF	CABRIO WG	AV	1138	Fungicida	piraclostrobina	Iniciar os tratamentos no Outono quando se verificar um abaixamento de temperatura e surjam as primeiras chuvas, prosseguir os tratamentos enquanto o tempo decorra frio e húmido. BBCH 31-85	4 / - 14	1000 - 1500 L/ha	1,125 g/ha	21 / -	O produto possui uma persistência biológica de 14 dias. Para evitar o desenvolvimento de resistências, o número máximo de tratamentos por ciclo cultural e no conjunto das doenças é de 4, com este fungicida ou outros QoI. Alternar com fungicidas com modos de ação diferentes.
Limoeiro	<i>Citrus limon</i>	-	A	Alternarize	Alternarize	BASF	CABRIO WG	AV	1138	Fungicida	piraclostrobina	Iniciar os tratamentos no Outono quando se verificar um abaixamento de temperatura e surjam as primeiras chuvas, prosseguir os tratamentos enquanto o tempo decorra frio e húmido. BBCH 31-85	4 / - 14	1000 - 1500 L/ha	1,125 g/ha	21 / -	O produto possui uma persistência biológica de 14 dias. Para evitar o desenvolvimento de resistências, o número máximo de tratamentos por ciclo cultural e no conjunto das doenças é de 4, com este fungicida ou outros QoI. Alternar com fungicidas com modos de ação diferentes.
Nogueira	<i>Juglans regia</i>	-	A	Antitranspirante	<i>Glycomnia leptostylid</i>	COFRIN - Centro Operacional e Tecnológico Hortofrutícola Nacional - Estrada de Leiria, S/N 2460-059 <i>Mutua</i>	CABRIO WG	AV	1138	Fungicida	piraclostrobina	Efectuar pulverizações mensais desde que a folhagem seja abundante	2 / 14 - 30	300 - 1000 L/ha	0,625 kg/ha	28 / -	Máximo de 2 tratamentos por ano, com este ou outros fungicidas do grupo QoI. Alternar com produtos com diferente modo de ação.