

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MENORES

CULTURA	ORGANISMO NÓCIVO	CONCENTRAÇÃO OU DOSE	VOLUME DE GALRIA	Nº MÁXIMO DE tratamentos	I. S. (dias)	MARCA COMERCIAL	SUBSTÂNCIA ATIVA	FUNÇÃO	EMPRESA	AUTORIZAÇÃO DE VENDA APIVAI (Nº)	REQUERENTE	DATA DE CONCESSÃO	Observações
ALCACHOFRRA (<i>Cynara scolymus</i>)	Oídio (<i>Leveillula taurica</i>)	0,6 L/ha	400 - 1000 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 2 tratamentos, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de ação.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
TOMATEIRO (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Cladosporiose (<i>Cladosporium spp</i>)	1 L/ha	400 - 1000 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 2 tratamentos, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de ação.	3	DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
MELANCIA (<i>Citrullus lanatus</i>)	Cladosporiose (<i>Cladosporium spp</i>)	0,6 L/ha	400 - 1000 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 3 tratamentos, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Não efectuar mais de 2 aplicações consecutivas com SDHI e alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de ação.	3	DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
MELOEIRO (<i>Cucumis melo</i>)	Cladosporiose (<i>Cladosporium spp</i>)	0,6 L/ha	400 - 1000 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 3 tratamentos, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Não efectuar mais de 2 aplicações consecutivas com SDHI e alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de ação.	3	DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
ABÓBORA (<i>Cucurbita pepo</i>)	Cladosporiose (<i>Cladosporium spp</i>)	0,6 L/ha	400 - 1000 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 3 tratamentos, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Não efectuar mais de 2 aplicações consecutivas com SDHI e alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de ação.	3	DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
ABOBORINHA (<i>Cucurbita pepo var. giromontina</i>)	Cladosporiose (<i>Cladosporium spp</i>)	0,6 L/ha	400 - 1000 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 3 tratamentos, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Não efectuar mais de 2 aplicações consecutivas com SDHI e alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de ação.	3	DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
PEPINO (<i>Cucumis sativus</i>)	Cladosporiose (<i>Cladosporium spp</i>)	0,6 L/ha	400 - 1000 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 3 tratamentos, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Não efectuar mais de 2 aplicações consecutivas com SDHI e alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de ação.	3	DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
CHICÓRIA DE FOLHAS (<i>Cichorium intybus var. foliosum</i>)	Ferrugem (<i>Puccinia hieracii</i>)	1 L/ha	400 - 1000 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 1 tratamento, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de ação.	14	DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
FUNCHO (<i>Foeniculum vulgare</i>)	Septoriose (<i>Septoria sp</i>)	2 L/ha	400 - 800 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 1 tratamento, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de ação.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
FUNCHO (<i>Foeniculum vulgare</i>)	podridão branca (<i>Sclerotinia sp</i>)	2 L/ha	400 - 800 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 1 tratamento, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de ação.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
AIPO DE CAULE (<i>Apium graveolens var. dulce</i>)	Septoriose (<i>Septoria sp</i>)	2 L/ha	400 - 800 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 1 tratamento, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de ação.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
AIPO DE CAULE (<i>Apium graveolens var. dulce</i>)	podridão branca (<i>Sclerotinia sp</i>)	2 L/ha	400 - 800 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 1 tratamento, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de ação.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
CARDO (<i>Cynara cardunculus</i>)	Septoriose (<i>Septoria sp</i>)	2 L/ha	400 - 800 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 1 tratamento, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de ação.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
CARDO (<i>Cynara cardunculus</i>)	podridão branca (<i>Sclerotinia sp</i>)	2 L/ha	400 - 800 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 1 tratamento, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de ação.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
RUIBARBO (<i>Rheum rhabarbarum</i>)	Septoriose (<i>Septoria sp</i>)	2 L/ha	400 - 800 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 1 tratamento, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de ação.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
RUIBARBO (<i>Rheum rhabarbarum</i>)	podridão branca (<i>Sclerotinia sp</i>)	2 L/ha	400 - 800 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 1 tratamento, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de ação.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
BETERRABA DE MESA (<i>Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva</i>)	Oídio (<i>Erysiphe heraclei</i>)	0,6 L/ha	400 - 1000 L/ha	Realizar 1 tratamento para este inimigo. Para evitar o risco de resistência, realizar o máximo 2 tratamentos por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de ação.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.

CULTURA	ORGANISMO NOCIVO	CONCENTRAÇÃO OU DOSE	VOLUME DE CALDA	Nº MÁXIMO DE tratamentos	I. S. (dias)	MARCA COMERCIAL	SUBSTÂNCIA ATIVA	FUNÇÃO	EMPRESA	AUTORIZAÇÃO DE VENDA AP/VI/AV N°	REQUERENTE	DATA DE CONCESSÃO	Observações
BETERRABA DE MESA (<i>Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva</i>)	podridão branca (<i>Sclerotinia sp</i>)	2 L/ha	400 - 1000 L/ha	Realizar 1 tratamento para este inimigo. Para evitar o risco de resistência, realizar o máximo 2 tratamentos por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de ação.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxapiróxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
RÚCULA (<i>Eruca vesicaria subsp. Sativa</i>)	podridão branca (<i>Sclerotinia sp</i>)	1,2 - 2 L/ha	400 - 1000 L/ha	Realizar 1 tratamento para este inimigo. Para evitar o risco de resistência, realizar o máximo 2 tratamentos por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de ação.	14	DAGONIS	difenoconazol + fluxapiróxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
RÚCULA (<i>Eruca vesicaria subsp. Sativa</i>)	podridão branca (<i>Sclerotinia sp</i>)	1,2 L/ha	400 - 1000 L/ha	Realizar 1 tratamento para este inimigo. Para evitar o risco de resistência, realizar o máximo 2 tratamentos por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de ação.	14	DAGONIS	difenoconazol + fluxapiróxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
BETERRABA DE MESA (<i>Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva</i>)	Alternária (<i>Alternaria sp</i>)	0,6 L/ha	400 - 1000 L/ha	Realizar 1 tratamento para este inimigo. Para evitar o risco de resistência, realizar o máximo 2 tratamentos por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de ação.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxapiróxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
BETERRABA DE MESA (<i>Beta vulgaris subsp. vulgaris var. conditiva</i>)	Alternária (<i>Alternaria sp</i>)	1 L/ha	400 - 1000 L/ha	Realizar 1 tratamento para este inimigo. Para evitar o risco de resistência, realizar o máximo 2 tratamentos por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de ação.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxapiróxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	20/11/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.