

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MENORES

CULTURA	ORGANISMO NOCIVO	CONCENTRAÇÃO OU DOSE	VOLUME DE CALDA	Nº MÁXIMO DE tratamentos	I. S. (dias)	MARCA COMERCIAL	SUBSTÂNCIA ATIVA	FUNÇÃO	EMPRESA	AUTORIZAÇÃO DE VENDA APV(A) Nº	REQUERENTE	DATA DE CONCESSÃO	Observações
ABÓBORA (<i>Cucurbita pepo</i>)	Cladosporiose (<i>Cladosporium spp</i>)	0,6 L/ha	400 - 1000 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 3 tratamentos, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Não efectuar mais de 2 aplicações consecutivas com SDHI e alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	3	DAGONIS	difenoconazol + fluxupiraxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
ABOBORINHA (<i>Cucurbita pepo</i> var. <i>griomontina</i>)	Cladosporiose (<i>Cladosporium spp</i>)	0,6 L/ha	400 - 1000 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 3 tratamentos, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Não efectuar mais de 2 aplicações consecutivas com SDHI e alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	3	DAGONIS	difenoconazol + fluxupiraxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
AIPO DE CAULE (<i>Apium graveolens</i> var. <i>dulce</i>)	Septoriose (<i>Septoria sp</i>)	2 L/ha	400 - 800 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 1 tratamento, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxupiraxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
AIPO DE CAULE (<i>Apium graveolens</i> var. <i>dulce</i>)	podridão branca (<i>Sclerotinia sp</i>)	2 L/ha	400 - 800 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 1 tratamento, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxupiraxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
ALCACHOFRÁ (<i>Cynara scolymus</i>)	Oídio (<i>Leveillula taurica</i>)	0,6 L/ha	400 - 1000 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 2 tratamentos, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxupiraxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
ALFACE (baby leaf)	podridão branca (<i>Sclerotinia sp</i>)	1,2 L/ha	500 - 1000 L/ha	Para evitar o risco de resistência, realizar o máximo 2 tratamentos por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	14	DAGONIS	difenoconazol + fluxupiraxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	07/08/2021	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
BETERRABA DE MESA (<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>)	Oídio (<i>Erysiphe heraclei</i>)	0,6 L/ha	400 - 1000 L/ha	Realizar 1 tratamento para este inimigo. Para evitar o risco de resistência, realizar o máximo 2 tratamentos por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxupiraxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
BETERRABA DE MESA (<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>)	podridão branca (<i>Sclerotinia sp</i>)	2 L/ha	400 - 1000 L/ha	Realizar 1 tratamento para este inimigo. Para evitar o risco de resistência, realizar o máximo 2 tratamentos por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxupiraxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
BETERRABA DE MESA (<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>)	Alternaéria (<i>Alternaria sp</i>)	0,6 L/ha	400 - 1000 L/ha	Realizar 1 tratamento para este inimigo. Para evitar o risco de resistência, realizar o máximo 2 tratamentos por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxupiraxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
BETERRABA DE MESA (<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>)	Alternaéria (<i>Alternaria sp</i>)	1 L/ha	400 - 1000 L/ha	Realizar 1 tratamento para este inimigo. Para evitar o risco de resistência, realizar o máximo 2 tratamentos por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxupiraxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	20/11/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
CARDO (<i>Cynara cardunculus</i>)	Septoriose (<i>Septoria sp</i>)	2 L/ha	400 - 800 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 1 tratamento, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxupiraxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
CARDO (<i>Cynara cardunculus</i>)	podridão branca (<i>Sclerotinia sp</i>)	2 L/ha	400 - 800 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 1 tratamento, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxupiraxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
CHICÓRIA DE FOLHAS (<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>)	Ferrugem (<i>Puccinia hieracii</i>)	1 L/ha	400 - 1000 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 1 tratamento, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	14	DAGONIS	difenoconazol + fluxupiraxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
ESPINAFRE (baby leaf)	podridão branca (<i>Sclerotinia sp</i>)	1,2 L/ha	500 - 1000 L/ha	Para evitar o risco de resistência, realizar o máximo 2 tratamentos por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	14	DAGONIS	difenoconazol + fluxupiraxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	06/08/2021	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
FUNCHO (<i>Foeniculum vulgare</i>)	Septoriose (<i>Septoria sp</i>)	2 L/ha	400 - 800 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 1 tratamento, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxupiraxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.
FUNCHO (<i>Foeniculum vulgare</i>)	podridão branca (<i>Sclerotinia sp</i>)	2 L/ha	400 - 800 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 1 tratamento, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	7	DAGONIS	difenoconazol + fluxupiraxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MENORES

Nome da Cultura	Doença	Dose	Condições de Aplicação	Resumo das Condições de Autorização	3	7	14	14	7	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	Data	Tratamento
MELCUIRO (<i>Cucumis melo</i>)	Cladospoiose (<i>Cladosporium spp</i>)	0,6 L/ha	400 - 1000 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 3 tratamentos, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Não efectuar mais de 2 aplicações consecutivas com SDHI e alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	3		DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.	
PEPINO (<i>Cucumis sativus</i>)	Cladospoiose (<i>Cladosporium spp</i>)	0,6 L/ha	400 - 1000 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 3 tratamentos, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Não efectuar mais de 2 aplicações consecutivas com SDHI e alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	3		DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.	
RÚCULA (baby leaf)	podridão branca (<i>Sclerotinia sp</i>)	1,2 L/ha	500 - 1000 L/ha	Para evitar o risco de resistência, realizar o máximo 2 tratamentos por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	14		DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	06/08/2021	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.	
RÚCULA (<i>Eruca vesicaria subsp. Sativa</i>)	podridão branca (<i>Sclerotinia sp</i>)	1,2 - 2 L/ha	400 - 1000 L/ha	Realizar 1 tratamento para este inimigo. Para evitar o risco de resistência, realizar o máximo 2 tratamentos por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	14		DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.	
RÚCULA (<i>Eruca vesicaria subsp. Sativa</i>)	podridão branca (<i>Sclerotinia sp</i>)	1,2 L/ha	400 - 1000 L/ha	Realizar 1 tratamento para este inimigo. Para evitar o risco de resistência, realizar o máximo 2 tratamentos por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	14		DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.	
RUBARBO (<i>Rheum rhabarbarum</i>)	Septoriose (<i>Septoria sp</i>)	2 L/ha	400 - 800 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 1 tratamento, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	7		DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.	
RUBARBO (<i>Rheum rhabarbarum</i>)	podridão branca (<i>Sclerotinia sp</i>)	2 L/ha	400 - 800 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 1 tratamento, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	7		DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.	
TOMATEIRO (<i>Solanum lycopersicum</i>)	Cladospoiose (<i>Cladosporium spp</i>)	1 L/ha	400 - 1000 L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências, realizar no máximo 2 tratamentos, por cultura e no conjunto das doenças, com este fungicida ou outro que contenha SDHI e/ou DMI. Alternar o uso deste produto com outros de diferente modo de acção.	3		DAGONIS	difenoconazol + fluxapiroxade	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	1401	BASF	29/10/2019	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas.	