

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MENORES (a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	Ar Livre / Protegida / Interior	Inimigo / Efeito a evitar	Nome Científico	Requerimento do UH	Destinação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/Intervalo (mín-máx) (dias)	Volume de Cálculo (mín-máx)	Dose (mín-máx)	I de Segurança/ de Reentrada (dias)	Cond. e Restrições Específicas
Eucalipto	<i>Eucalyptus</i> sp.	viveros		oidio		ALTI FLORESTAL	KJMULLUS S	APV	1259	Fungicida	enxofre		- / -			- / -	
Pimentão	<i>Capsicum annuum</i>	-		oidio	<i>Leveillula taurica</i>	Moniz	KJMULLUS S	APV	1259	Fungicida	enxofre		- / -	200 - 1000 L/ha		- / -	Máximo 4 aplicações, com intervalos entre os 14 e 21 dias Ar livre e cultura protegida a) Tratar em condições favoráveis ao oídio, desde as 3-5 folhas verdadeiras
Lúpulo	<i>Humulus lupulus</i>	-	A	Oídio	<i>Podosphepha macularis</i>	Bialupulo Produtões de Lupulo de Bragança e Braga CRL, Apartado 1, 5300 Bragança	KJMULLUS S	APV	1259	Fungicida	enxofre	Tratar durante a floração (BBCH 60-65)	3 / 7 - 10	800 - 1200 L/ha	4 - 6 Kg/ha	- / -	-
Abóbora (abóbora-menina)	<i>Cucurbita maxima</i>	-	A	Oídio	<i>Göbelomyces cichoracearum</i>	CAMPOSOL II, Lda Herdade dos Nascentes, EN 393, KM 6, APT 123, 7645 909 Vila Nova de Milfontes	KJMULLUS S	APV	1259	Fungicida	enxofre	Iniciar às 3-5 folhas definidas (BBCH 13-15), repetido enquanto as condições forem favoráveis ao desenvolvimento do oídio.	4 / 10 - 14	300 - 1000 L/ha	2 - 3 Kg/ha	1 / -	-
Nabo	<i>Brassica napus</i>	-	A	Oídio	<i>Oidium</i> sp.	CAMPOSOL II, Lda Herdade dos Nascentes, EN 393, KM 6, APT 123, 7645 909 Vila Nova de Milfontes	KJMULLUS S	APV	1259	Fungicida	enxofre	Iniciar às 3-5 folhas definidas (BBCH 13-15), repetido enquanto as condições forem favoráveis ao desenvolvimento do oídio.	3 / 10 - 14	300 - 600 L/ha	2 Kg/ha	1 / -	-
Rabanete	<i>Raphanus sativus L.</i>	-	A	Oídio	<i>Oidium</i> sp.	CAMPOSOL II, Lda Herdade dos Nascentes, EN 393, KM 6, APT 123, 7645 909 Vila Nova de Milfontes	KJMULLUS S	APV	1259	Fungicida	enxofre	Iniciar às 3-5 folhas definidas (BBCH 13-15), repetido enquanto as condições forem favoráveis ao desenvolvimento do oídio.	2 / 10 - 14	300 - 600 L/ha	2 Kg/ha	1 / -	-
Salsa	<i>Petroselinum crispum</i>	-	A	Oídio	<i>Oidium</i> sp.	CAMPOSOL II, Lda Herdade dos Nascentes, EN 393, KM 6, APT 123, 7645 909 Vila Nova de Milfontes	KJMULLUS S	APV	1259	Fungicida	enxofre	Iniciar às 3-5 folhas definidas (BBCH 13-15), repetido enquanto as condições forem favoráveis ao desenvolvimento do oídio.	3 / 10 - 14	300 - 1000 L/ha	1,5 Kg/ha	1 / -	-
Salsa-de-raiz-grossa	<i>Petroselinum crispum var. tuberosum</i>	-	A	Oídio	<i>Oidium</i> sp.	CAMPOSOL II, Lda Herdade dos Nascentes, EN 393, KM 6, APT 123, 7645 909 Vila Nova de Milfontes	KJMULLUS S	APV	1259	Fungicida	enxofre	Iniciar às 3-5 folhas definidas (BBCH 13-15), repetido enquanto as condições forem favoráveis ao desenvolvimento do oídio.	3 / 10 - 14	300 - 1000 L/ha	2 Kg/ha	1 / -	-
Abobrinha (courgette)	<i>Cucurbita pepo var. gytanominata</i>	-	A	Oídio	<i>Göbelomyces cichoracearum</i>	CAMPOSOL II, Lda Herdade dos Nascentes, EN 393, KM 6, APT 123, 7645 909 Vila Nova de Milfontes	KJMULLUS S	APV	1259	Fungicida	enxofre	Iniciar às 3-5 folhas definidas (BBCH 13-15), repetido enquanto as condições forem favoráveis ao desenvolvimento do oídio.	3 / 10 - 14	300 - 1000 L/ha	2 - 3 Kg/ha	1 / -	-
Melancia	<i>Citrullus lanatus</i>	-	A	Oídio	<i>Göbelomyces cichoracearum</i>	CAMPOSOL II, Lda Herdade dos Nascentes, EN 393, KM 6, APT 123, 7645 909 Vila Nova de Milfontes	KJMULLUS S	APV	1259	Fungicida	enxofre	Iniciar às 3-5 folhas definidas (BBCH 13-15), repetido enquanto as condições forem favoráveis ao desenvolvimento do oídio.	4 / 10 - 14	300 - 1000 L/ha	2 - 3 Kg/ha	1 / -	-
Couve-de-Pequim	<i>Brassica napus subsp. pekinensis</i>	-	A	Oídio	<i>Oidium</i> sp.	CAMPOSOL II, Lda Herdade dos Nascentes, EN 393, KM 6, APT 123, 7645 909 Vila Nova de Milfontes	KJMULLUS S	APV	1259	Fungicida	enxofre	Iniciar às 3-5 folhas definidas (BBCH 13-15), repetido enquanto as condições forem favoráveis ao desenvolvimento do oídio.	4 / 10 - 14	300 - 1000 L/ha	2 - 3 Kg/ha	1 / -	-
Abóbora (abóbora-almiscarada)	<i>Cucurbita moschata</i>	-	A	Oídio	<i>Göbelomyces cichoracearum</i>	CAMPOSOL II, Lda Herdade dos Nascentes, EN 393, KM 6, APT 123, 7645 909 Vila Nova de Milfontes	KJMULLUS S	APV	1259	Fungicida	enxofre	Iniciar às 3-5 folhas definidas (BBCH 13-15), repetido enquanto as condições forem favoráveis ao desenvolvimento do oídio.	4 / 10 - 14	300 - 1000 L/ha	2 - 3 Kg/ha	1 / -	-
Abóbora (abóbora-porqueta)	<i>Cucurbita pepo</i>	-	A	Oídio	<i>Göbelomyces cichoracearum</i>	CAMPOSOL II, Lda Herdade dos Nascentes, EN 393, KM 6, APT 123, 7645 909 Vila Nova de Milfontes	KJMULLUS S	APV	1259	Fungicida	enxofre	Iniciar às 3-5 folhas definidas (BBCH 13-15), repetido enquanto as condições forem favoráveis ao desenvolvimento do oídio.	4 / 10 - 14	300 - 1000 L/ha	2 - 3 Kg/ha	1 / -	-
Couve-lombarda	<i>Brassica oleracea var. capitata f. alaba</i>	-	A	Oídio	<i>Oidium</i> sp.	CAMPOSOL II, Lda Herdade dos Nascentes, EN 393, KM 6, APT 123, 7645 909 Vila Nova de Milfontes	KJMULLUS S	APV	1259	Fungicida	enxofre	Iniciar às 3-5 folhas definidas (BBCH 13-15), repetido enquanto as condições forem favoráveis ao desenvolvimento do oídio.	4 / 10 - 14	300 - 1000 L/ha	2 - 3 Kg/ha	1 / -	-
Couve-repolho	<i>Brassica oleracea var. capitata f. alaba</i>	-	A	Oídio	<i>Oidium</i> sp.	CAMPOSOL II, Lda Herdade dos Nascentes, EN 393, KM 6, APT 123, 7645 909 Vila Nova de Milfontes	KJMULLUS S	APV	1259	Fungicida	enxofre	Iniciar às 3-5 folhas definidas (BBCH 13-15), repetido enquanto as condições forem favoráveis ao desenvolvimento do oídio.	4 / 10 - 14	300 - 1000 L/ha	2 - 3 Kg/ha	1 / -	-
Couve-coração	<i>Brassica oleracea var. capitata f. conica</i>	-	A	Oídio	<i>Oidium</i> sp.	CAMPOSOL II, Lda Herdade dos Nascentes, EN 393, KM 6, APT 123, 7645 909 Vila Nova de Milfontes	KJMULLUS S	APV	1259	Fungicida	enxofre	Iniciar às 3-5 folhas definidas (BBCH 13-15), repetido enquanto as condições forem favoráveis ao desenvolvimento do oídio.	4 / 10 - 14	300 - 1000 L/ha	2 - 3 Kg/ha	1 / -	-
Abóbora (abóbora-cabaça)	<i>Lagenaria siceraria</i>	-	A	Oídio	<i>Göbelomyces cichoracearum</i>	CAMPOSOL II, Lda Herdade dos Nascentes, EN 393, KM 6, APT 123, 7645 909 Vila Nova de Milfontes	KJMULLUS S	APV	1259	Fungicida	enxofre	Iniciar às 3-5 folhas definidas (BBCH 13-15), repetido enquanto as condições forem favoráveis ao desenvolvimento do oídio.	4 / 10 - 14	300 - 1000 L/ha	2 - 3 Kg/ha	1 / -	-
Abóbora (abóbora-chia)	<i>Cucurbita ficifolia</i>	-	A	Oídio	<i>Göbelomyces cichoracearum</i>	CAMPOSOL II, Lda Herdade dos Nascentes, EN 393, KM 6, APT 123, 7645 909 Vila Nova de Milfontes	KJMULLUS S	APV	1259	Fungicida	enxofre	Iniciar às 3-5 folhas definidas (BBCH 13-15), repetido enquanto as condições forem favoráveis ao desenvolvimento do oídio.	4 / 10 - 14	300 - 1000 L/ha	2 - 3 Kg/ha	1 / -	-
Abóbora (abóbora-almiscarada)	<i>Cucurbita moschata</i>	-	A	Oídio	<i>Göbelomyces cichoracearum</i>	CAMPOSOL II, Lda Herdade dos Nascentes, EN 393, KM 6, APT 123, 7645 909 Vila Nova de Milfontes	KJMULLUS S	APV	1259	Fungicida	enxofre	Iniciar às 3-5 folhas definidas (BBCH 13-15), repetido enquanto as condições forem favoráveis ao desenvolvimento do oídio.	2 / 10 - 14	300 - 600 L/ha	2 Kg/ha	1 / -	-
Abóbora (abóbora-porqueta)	<i>Cucurbita pepo</i>	-	A	Oídio	<i>Göbelomyces cichoracearum</i>	CAMPOSOL II, Lda Herdade dos Nascentes, EN 393, KM 6, APT 123, 7645 909 Vila Nova de Milfontes	KJMULLUS S	APV	1259	Fungicida	enxofre	Iniciar às 3-5 folhas definidas (BBCH 13-15), repetido enquanto as condições forem favoráveis ao desenvolvimento do oídio.	3 / 10 - 14	300 - 1000 L/ha	1,5 Kg/ha	1 / -	-

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MENORES (a eficácia e a fitobiodiversidade nestas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	Ar Livre / Protegida / Interior	Inimigo / Efeito a atingir	Nome Científico	Requerente do UM	Designação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/Intervalo (min-máx) (dias)	Volume de Cálculo (min-máx)	Dose (min-máx)	L de Segurança/Retirada (dias)	Cond. e Restrições Específicas
Couve-lombarda	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>sabauda</i>	-	A	Oídio	<i>Oidium sp.</i>	CAMPOSOL II, Lda Herdade dos Nascentes, EN 393, Km 6, APT 123, 7645- 909 Vila Nova de Milfontes	KUMULUS S.	APV	1259	Fungicida	enxofre	Iniciar às 3-5 folhas definitivas (BBCH 13-15), repetindo enquanto as condições forem favoráveis ao desenvolvimento do oídio.	3 / 10 - 14	300 - 1000 L/ha	2 Kg/ha	1 / -	-
Couve-repolho	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata f. alba</i>	-	A	Oídio	<i>Oidium sp.</i>	CAMPOSOL II, Lda Herdade dos Nascentes, EN 393, Km 6, APT 123, 7645- 909 Vila Nova de Milfontes	KUMULUS S.	APV	1259	Fungicida	enxofre	Iniciar às 3-5 folhas definitivas (BBCH 13-15), repetindo enquanto as condições forem favoráveis ao desenvolvimento do oídio.	3 / 10 - 14	300 - 1000 L/ha	2 - 3 Kg/ha	1 / -	-