

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MELHORES (a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações melhores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	A: Livre / Protegida / Interior	Inimigo / Efeito a evitar	Nome Científico	Requerente do UM	Designação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/Intervalo (mín- máx) (dias)	Volume de Cálida (mín- máx)	Dose (mín-máx)	L de Segurança/ de Reentrada (dias)	Condi. e Restrições Específicas
Morangueiro	<i>Fragaria x ananassa</i>	-	P	Aranhigo-amarelo	<i>Tetranychus urticae</i>	BASF	NEALTA	AV	1146	Inseticida/ acaricida	clifumetofena	Aplicar ao aparecimento da praga [BSC1 13-89 ou em pós-colheita] [BSC1 91-97]	1 / -	200 - 400 L/ha	1 L/ha	1 / -	Máximo 1 aplicação por cultura, no conjunto dos frangos, em cada 2 anos
Morangueiro	<i>Fragaria x ananassa</i>	-	P	Ácaro-do-morangueiro	<i>Phytoseiulus pallidus</i>	BASF	NEALTA	AV	1146	Inseticida/ acaricida	clifumetofena	Aplicar ao aparecimento da praga [BSC1 13-89] [BSC1 91-97] (pós-colheita)	1 / -	200 - 400 L/ha	1 L/ha	1 / -	Máximo 1 aplicação por cultura, no conjunto dos frangos, em cada 2 anos
Ornamentais (folhas e flores)	-	Inclui herbáceas e arbustos	P	Aranhigo-amarelo	<i>Tetranychus urticae</i>	BASF	NEALTA	AV	1146	Inseticida/ acaricida	clifumetofena	Aplicar ao aparecimento da praga em qualquer fase de desenvolvimento da cultura.	2 / 10 - 14	200 - 400 L/ha	1 L/ha	- / -	Apenas em cultivo sem solo (exemplo: em vasos)