

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MENORES

CULTURA	ORGANISMO NOCIVO	CONCENTRAÇÃO OU DOSE	VOLUME DE GALDA	Nº MÁXIMO DE TRATAMENTOS	I. S. (dias)	MARCA COMERCIAL	SUBSTÂNCIA ATIVA	FUNÇÃO	EMPRESA	AUTORIZAÇÃO DE VENDA AP/VI/AV Nº)	REQUERENTE	DATA DE CONCESSÃO
VIVEIRO DE CULTURAS ORNAMENTAIS PARA PRODUÇÃO DE ESTACAS	Míldio (<i>Phytophthora sp</i>)	400 - 800 mL/ha	500 - 1000 L/ha	Durante todo o ano , ao aparecimento dos primeiros sintomas da doença. Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 3 tratamentos por campanha, com ORVEGO ou com outros fungicidas do grupo CAA e/ou QoS. Deve-se praticar a rotação de s. a's com diferentes modos de ação.	-	ORVEGO	ametocrodina + dimetomorfe	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	204	Syngenta Moncarapacho	18/03/2019