

EXTENÇÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MELHORES (a eficácia e a fitobiotidade nestas utilizações melhores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	Ar Livre / Protegida / Interior	Inimigo / Efeito a evitar	Nome Científico	Requerente do UM	Designação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/Intervalo (mínimo) (dias)	Volume de Cálculo (mínimo)	Dose (mínimo)	L de Segurança/L de Reentrada (dias)	Condições e Restrições Específicas
Viveiros de ornamentais para produção de estacas	-	-	P	Mídio	Mídio	Syngenta Moncarapacho - Sítio dos Murais, Quinta 8700-906 Moncarapacho	ORVEGO	AV	0852	Fungicida	ametotradina + dimetomorfe	Durante todo o ano ,ao aparecimento dos primeiros sintomas da doença	3 / 7 - 10	500 - 1000 L/ha	400 - 800 mL/ha	- / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 3 tratamentos por campanha, com ORVEGO ou com outros fungicidas do grupo CAZ ou QSD. Deve-se praticar a rotação de s.a.s com diferentes modos de ação.