

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MENORES

CULTURA	ORGANISMO NOCIVO	CONCENTRAÇÃO OU DOSE	VOLUME DE CALDA	Nº MÁXIMO DE TRATAMENTOS	I. S. (dias)	MARCA COMERCIAL	SUBSTÂNCIA ATIVA	FUNÇÃO	EMPRESA	AUTORIZAÇÃO DE VENDA AP/AV (Nº)	REQUERENTE	DATA DE CONCESSÃO	OBSERVAÇÕES
ALHO-PORRO (<i>Allium porrum</i> L.)	alternariose (<i>Alternaria porri</i>)	2 L p.c./ha			14	SCALA	pirimetanil (anilino pirimidina)	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	3538	AIHO	01/06/2011	
ERVILHEIRA (<i>Pisum sativum</i> L.)	antracnose (<i>Glomerella cingulata</i>)	1,5 L p.c./ha			14	SCALA	pirimetanil (anilino pirimidina)	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	3538	MONLIZ	18/02/2011	
ERVILHEIRA (<i>Pisum sativum</i> L.)	podridão cinzenta (<i>Botrytis cinerea</i>)	1,5 L p.c./ha			14	SCALA	pirimetanil (anilino pirimidina)	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	3538	MONLIZ	18/02/2011	
GRÃO-DE-BICO (<i>Cicer arvense</i>)	raiva (<i>Ascochyta rabiei</i>)	1,5L p.c./ha	1000L/ha	Máximo 2 tratamentos com este p.c. ou do grupo das anilino pirimidinas, até ao início da floração	- (ar livre)	SCALA	pirimetanil (anilino pirimidina)	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	642	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BEJA E BRINCHES, C.R.L.	03/03/2016	
MIRTILO (<i>Vaccinium corymbosum</i> ; <i>Vaccinium myrtillus</i>)	podridão cinzenta (<i>Botrytis cinerea</i>)	2L p.c./ha		Máximo 2 tratamentos	14	SCALA	pirimetanil (anilino pirimidina)	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	3538	MIRTSUL	03/10/2007	Agricultura de ar livre. Iniciar os tratamentos a partir da floração com intervalo entre aplicações de 10 dias
FRAMBOESA (<i>Rubus idaeus</i>)	podridão cinzenta (<i>Botrytis cinerea</i>)	2L p.c./ha	400-2000L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos com este ou outro fungicida do grupo das anilino pirimidinas. Efetuar um único tratamento em cada três antibióticos. Alternar o uso deste produto com outros fungicidas de diferente modo de ação.	7	SCALA	pirimetanil (anilino pirimidina)	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	642	LUSOMORANGO	19/08/2019	Tratar preventivamente no início da floração ou, eventualmente, em plena floração e à formação do fruto (BBCH 60-79) Intervalo de reentrada 24h. SPe3
AMORA (<i>Rubus</i> sp.)	podridão cinzenta (<i>Botrytis cinerea</i>)	2L p.c./ha	400-2000L/ha	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos com este ou outro fungicida do grupo das anilino pirimidinas. Efetuar um único tratamento em cada três antibióticos. Alternar o uso deste produto com outros fungicidas de diferente modo de ação.	7	SCALA	pirimetanil (anilino pirimidina)	FU	BASF PORTUGUESA, S.A.	642	LUSOMORANGO	19/08/2019	Tratar preventivamente no início da floração ou eventualmente, em plena floração e à formação do fruto (BBCH 60-79) Intervalo de reentrada 24h. SPe3