

EXTENÇÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MELHORES (a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	Ar Livre / Protegida / Interior	Inimigo / Efeito a evitar	Nome Científico	Requerente do UM	Designação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/Intervalo (mínimo) (dias)	Volume de Cálida (mínimo)	Dose (mínimo)	I. de Segurança/ de Reentrada (dias)	Cond. e Restrições Específicas
Alio-porri (salvo batata-doce)	<i>Allium porum</i>	-		alternariose	<i>Alternaria porri</i>	AHO	SCALA	AV	0642	Fungicida	pirimetanil		- / -		2 - L/ha	14 / -	
Endiveira	<i>Pisum sativum</i>	-		antracnose	<i>Glomerella cingulata</i>	MONLIZ	SCALA	AV	0642	Fungicida	pirimetanil		- / -		1,5 - L/ha	14 / -	
Endiveira	<i>Pisum sativum</i>	-		oídio/cinza	<i>Botrytis cinerea</i>	MONLIZ	SCALA	AV	0642	Fungicida	pirimetanil		- / -		1,5 - L/ha	14 / -	
Mirtilo (=arando)	<i>Vaccinium corymbosum</i> / <i>Vaccinium myrtillus</i>	-		podridão cinzenta	<i>Botrytis cinerea</i>	MIRTISUL	SCALA	AV	0642	Fungicida	pirimetanil		- / -			14 / -	Máximo 2 tratamentos. Agricultura de ar livre (a) Iniciar os tratamentos a partir da floração. (b) Intervalo entre aplicações: 10 dias.
Grão-de-bico	<i>Cicer arietinum</i>	-	A	Raiva	<i>Ascochyta rabiei</i>	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BEJA E BRINCHES, C.P.L., Rua Dr. Mira Fernandes nº 2 - Apartado 14 7801-901 Beja	SCALA	AV	0642	Fungicida	pirimetanil	Tratar até início da floração (até BBCH 12-49)	2 / 7 - 10	500 - 1000 L/ha	1,5 L/ha	- / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos com este ou outro fungicida do grupo das anilinoimidazóis. Alternar o uso deste produto com outros fungicidas de diferente modo de ação.
Framboesa	<i>Rubus idaeus</i>	-	A+P	podridão cinzenta	<i>Botrytis cinerea</i>	Lusomorang, SA (Apartado 66, 7630-908 S. Teotónio)	SCALA	AV	0642	Fungicida	pirimetanil	Tratar preventivamente no início da floração ou eventualmente em plena floração e a formação do fruto (BBCH 60-79)	2 / 10 -	400 - 2000 L/ha	2 L/ha	7 / 24h	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos com este ou outro fungicida do grupo das anilinoimidazóis. Efeetuar um único tratamento em cada três aplicações. Alternar o uso deste produto com outros fungicidas de diferente modo de ação.
Amora-silvestre	<i>Rubus fruticosus</i>	-	A+P	podridão cinzenta	<i>Botrytis cinerea</i>	Lusomorang, SA (Apartado 66, 7630-908 S. Teotónio)	SCALA	AV	0642	Fungicida	pirimetanil	Tratar preventivamente no início da floração ou eventualmente em plena floração e a formação do fruto (BBCH 60-79)	2 / 10 -	400 - 2000 L/ha	2 L/ha	7 / 24h	Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 2 tratamentos com este ou outro fungicida do grupo das anilinoimidazóis. Efeetuar um único tratamento em cada três aplicações. Alternar o uso deste produto com outros fungicidas de diferente modo de ação.