

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MELHORES (a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações melhores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	Ar Livre / Protegida / Interior	Inimigo / Efeito a evitar	Nome Científico	Requerente do UM	Designação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/Intervalo (mín-máx) (dias)	Volume de Cálida (mín-máx)	Dose (mín-máx)	L de Segurança/ de Reentrada (dias)	Condi. e Restrições Específicas
arroz	<i>Oryza sativa</i>	-	A	pericarpíose	<i>Pyricularia oryzae</i>	BASF	SELTIMA	AV	1562	Fungicida	piraclostrobina	Aplicar antes da emergência das primeiras panículas (BBCH 39 - 65).	1 / -	50 - 100 L/ha	0,75 - 1 L/ha	* / -	A dose de utilização depende da cobertura do solo pela cultura. • cobertura do solo igual ou superior a 75% (pleno afilhamento até à fase final da floração): 1 L/ha • cobertura do solo inferior a 75%: 0,75 L/ha Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 1 tratamento por ciclo cultural, no conjunto das doenças, com este produto ou com outro com o mesmo modo de ação (Qa). * IS coberto pela época de
arroz	<i>Oryza sativa</i>	-	A	Helmintosporíose	<i>Cochliobolus myabeanus</i>	BASF	SELTIMA	AV	1562	Fungicida	piraclostrobina	Aplicar após o aparecimento dos primeiros sintomas. Desde a folha bandeira completamente desenvolvida até à plena floração (anteras visíveis na maioria das espigas) (BBCH 39 - 65).	1 / -	50 - 100 L/ha	0,75 - 1 L/ha	* / -	A dose de utilização depende da cobertura do solo pela cultura. • cobertura do solo igual ou superior a 75% (pleno afilhamento até à fase final da floração): 1 L/ha • cobertura do solo inferior a 75%: 0,75 L/ha Para evitar o desenvolvimento de resistências realizar no máximo 1 tratamento por ciclo cultural, no conjunto das doenças, com este produto ou com outro com o mesmo modo de ação (Qa).