

EXTERIÇOS DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÕES MENORES (a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	Ar Livre / Protegida / Interior	Inimigo / Efeito a evitar	Nome Científico	Requerente do UM	Destinação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/Intervalo (mín-máx) (dias)	Volume de Cálculo (mín-máx)	Dose (mín-máx)	L de Segurança/ de Reentrada (dias)	Cond. e Restrições Específicas
Actinidia (=kiwi)	<i>Actinidia deliciosa</i>	-	A	Podridão-cinzenta	<i>Botrytis fuckeliana</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Tratar preventivamente entre o aparecimento dos bolões florais e a queda das folhas. (BBCH 15-98)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Actinidia (=kiwi)	<i>Actinidia deliciosa</i>	-	A	Bacteriose PSA	<i>Pseudomonas syringae pv. actinidiae</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Tratar preventivamente entre o aparecimento dos bolões florais e a queda das folhas. (BBCH 15-98)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-de-Bruxelas	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmifera</i>	-	A	Estenfiliose	<i>Stemphylium</i> sp.	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Realizar aplicações preventivamente desde o início da formação da cabeça quando o tempo decora húmido ou chuvoso. (BBCH 41-48)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-repolho	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata f. alba</i>	-	A	Estenfiliose	<i>Stemphylium</i> sp.	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Realizar aplicações preventivamente desde o início da formação da cabeça quando o tempo decora húmido ou chuvoso. (BBCH 41-48)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-lombarda	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>sabauda</i>	-	A	Estenfiliose	<i>Stemphylium</i> sp.	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Realizar aplicações preventivamente desde o início da formação da cabeça quando o tempo decora húmido ou chuvoso. (BBCH 41-48)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-rosa	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata f. rubra</i>	-	A	Estenfiliose	<i>Stemphylium</i> sp.	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Realizar aplicações preventivamente desde o início da formação da cabeça quando o tempo decora húmido ou chuvoso. (BBCH 41-48)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-coração	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata f. conica</i>	-	A	Estenfiliose	<i>Stemphylium</i> sp.	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Realizar aplicações preventivamente desde o início da formação da cabeça quando o tempo decora húmido ou chuvoso. (BBCH 41-48)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-flor	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>	-	A	Estenfiliose	<i>Stemphylium</i> sp.	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Realizar aplicações preventivamente desde o início da formação da cabeça quando o tempo decora húmido ou chuvoso. (BBCH 41-48)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-brócolo	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	-	A	Estenfiliose	<i>Stemphylium</i> sp.	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Realizar aplicações preventivamente desde o início da formação da cabeça quando o tempo decora húmido ou chuvoso. (BBCH 41-48)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-de-Bruxelas	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmifera</i>	-	A	Bacterioses	<i>Pseudomonas</i> sp. <i>Xanthomonas</i> sp.	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Tratar preventivamente desde as 3 folhas verdadeiras. (BBCH 13-89)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-repolho	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata f. alba</i>	-	A	Bacterioses	<i>Pseudomonas</i> sp. <i>Xanthomonas</i> sp.	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Tratar preventivamente desde as 3 folhas verdadeiras. (BBCH 13-89)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-lombarda	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>sabauda</i>	-	A	Bacterioses	<i>Pseudomonas</i> sp. <i>Xanthomonas</i> sp.	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Tratar preventivamente desde as 3 folhas verdadeiras. (BBCH 13-89)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-rosa	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata f. rubra</i>	-	A	Bacterioses	<i>Pseudomonas</i> sp. <i>Xanthomonas</i> sp.	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Tratar preventivamente desde as 3 folhas verdadeiras. (BBCH 13-89)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-coração	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata f. conica</i>	-	A	Bacterioses	<i>Pseudomonas</i> sp. <i>Xanthomonas</i> sp.	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Tratar preventivamente desde as 3 folhas verdadeiras. (BBCH 13-89)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-flor	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>	-	A	Bacterioses	<i>Pseudomonas</i> sp. <i>Xanthomonas</i> sp.	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Tratar preventivamente desde as 3 folhas verdadeiras. (BBCH 13-89)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-brócolo	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	-	A	Bacterioses	<i>Pseudomonas</i> sp. <i>Xanthomonas</i> sp.	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Tratar preventivamente desde as 3 folhas verdadeiras. (BBCH 13-89)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-de-Bruxelas	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmifera</i>	-	A	Alternaíose	<i>Alternaria brassicae</i> <i>Alternaria brassicicola</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Tratar preventivamente desde as 3 folhas verdadeiras. (BBCH 13-89)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-repolho	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata f. alba</i>	-	A	Alternaíose	<i>Alternaria brassicae</i> <i>Alternaria brassicicola</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Tratar preventivamente desde as 3 folhas verdadeiras. (BBCH 13-89)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-lombarda	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>sabauda</i>	-	A	Alternaíose	<i>Alternaria brassicae</i> <i>Alternaria brassicicola</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Tratar preventivamente desde as 3 folhas verdadeiras. (BBCH 13-89)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-rosa	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata f. rubra</i>	-	A	Alternaíose	<i>Alternaria brassicae</i> <i>Alternaria brassicicola</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Tratar preventivamente desde as 3 folhas verdadeiras. (BBCH 13-89)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-coração	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata f. conica</i>	-	A	Alternaíose	<i>Alternaria brassicae</i> <i>Alternaria brassicicola</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Tratar preventivamente desde as 3 folhas verdadeiras. (BBCH 13-89)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-flor	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>	-	A	Alternaíose	<i>Alternaria brassicae</i> <i>Alternaria brassicicola</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Tratar preventivamente desde as 3 folhas verdadeiras. (BBCH 13-89)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-brócolo	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	-	A	Alternaíose	<i>Alternaria brassicae</i> <i>Alternaria brassicicola</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Tratar preventivamente desde as 3 folhas verdadeiras. (BBCH 13-89)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Envinheta	<i>Pisum sativum</i>	-	A	Sclerotinia	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifera estirpe MB 600	Inciar os tratamentos preventivamente, em condições de baixo a moderado ataque da doença, desde as 5 folhas verdadeiras até à colheita (BBCH15-89)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MENORES (a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	Ar Livre / Protegida / Interior	Inimigo / Efeito alérgico	Nome Científico	Requerente do UM	Designação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/Intensidade (min-máx) (dias)	Volume de Cálculo (min-máx)	Dose (min-máx)	L de Segurança/ de Reentrada (dias)	Cond. e Restrições Específicas
Amendoim	<i>Arachis hypogaea</i>	-	A	Sclerotinia	<i>Sclerotinia</i> sp.	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloqueliceni estirpe MBI 600	Iniciar os tratamentos preventivamente, em condições de baixo a moderado ataque da doença, desde as 5 folhas verdadeiras até à colheita (BBCH15-80).	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Ervilheira	<i>Pisum sativum</i>	-	A	Ascoquia	<i>Didymella pisi</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloqueliceni estirpe MBI 600	Iniciar os tratamentos preventivamente, em condições de baixo a moderado ataque da doença, desde as 5 folhas verdadeiras até à colheita (BBCH15-80).	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Ervilheira	<i>Pisum sativum</i>	-	A	Antracnose	<i>Glomerella cingulata</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloqueliceni estirpe MBI 600	Iniciar os tratamentos preventivamente, em condições de baixo a moderado ataque da doença, desde as 5 folhas verdadeiras até à colheita (BBCH15-80).	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Meloeiro	<i>Cucumis melo</i>	-	A	Oídio	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloqueliceni estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Melancia	<i>Citrullus lanatus</i>	-	A	Oídio	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloqueliceni estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Pepino	<i>Cucumis sativus</i>	-	A+P	Oídio	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloqueliceni estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-merina)	<i>Cucurbita maxima</i>	-	A+P	Oídio	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloqueliceni estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-amisicarda)	<i>Cucurbita moschata</i>	-	A+P	Oídio	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloqueliceni estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-porqueira)	<i>Cucurbita pepo</i>	-	A+P	Oídio	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloqueliceni estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Aboborinha (=courgette)	<i>Cucurbita pepo var. giromontina</i>	-	A+P	Oídio	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloqueliceni estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Meloeiro	<i>Cucumis melo</i>	-	A+P	Cancro gomoso	<i>Stagonosporopsis cucurbitacearum</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloqueliceni estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Melancia	<i>Citrullus lanatus</i>	-	A+P	Cancro gomoso	<i>Stagonosporopsis cucurbitacearum</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloqueliceni estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Pepino	<i>Cucumis sativus</i>	-	A+P	Cancro gomoso	<i>Stagonosporopsis cucurbitacearum</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloqueliceni estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-merina)	<i>Cucurbita maxima</i>	-	A+P	Cancro gomoso	<i>Stagonosporopsis cucurbitacearum</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloqueliceni estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-amisicarda)	<i>Cucurbita moschata</i>	-	A+P	Cancro gomoso	<i>Stagonosporopsis cucurbitacearum</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloqueliceni estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-porqueira)	<i>Cucurbita pepo</i>	-	A+P	Cancro gomoso	<i>Stagonosporopsis cucurbitacearum</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloqueliceni estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Aboborinha (=courgette)	<i>Cucurbita pepo var. giromontina</i>	-	A+P	Cancro gomoso	<i>Stagonosporopsis cucurbitacearum</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloqueliceni estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Meloeiro	<i>Cucumis melo</i>	-	A	Alternariose	<i>Alternaria cucumeris</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloqueliceni estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Melancia	<i>Citrullus lanatus</i>	-	A	Alternariose	<i>Alternaria cucumeris</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloqueliceni estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Pepino	<i>Cucumis sativus</i>	-	A+P	Alternariose	<i>Alternaria cucumeris</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloqueliceni estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Abóbora-merina	<i>Cucurbita maxima</i>	-	A+P	Alternariose	<i>Alternaria cucumeris</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloqueliceni estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Abóbora-amisicarda	<i>Cucurbita moschata</i>	-	A+P	Alternariose	<i>Alternaria cucumeris</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloqueliceni estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MENORES (a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	Ar Livre / Protegida / Interior	Inimigo / Efeito a evitar	Nome Científico	Requerente do UM	Designação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/Intensidade (min-máx) (dias)	Volume de Cálculo (min-máx)	Dose (min-máx)	I. de Segurança, de Reentrada (dias)	Cond. e Restrições Específicas
Abóbora-porqueta	<i>Cucurbita pepo</i>	-	A+P	Alternariose	<i>Alternaria cucumerina</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Aboborinha (courgette)	<i>Cucurbita pepo var. gironomatina</i>	-	A+P	Alternariose	<i>Alternaria cucumerina</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Meleiro	<i>Cucumis melo</i>	-	A+P	Rizoctónia	<i>Rhizoctonia sp</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Melancia	<i>Citrullus lanatus</i>	-	A+P	Rizoctónia	<i>Rhizoctonia sp</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Pepino	<i>Cucumis sativus</i>	-	A+P	Rizoctónia	<i>Rhizoctonia sp</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Abóbora-menina	<i>Cucurbita maxima</i>	-	A+P	Rizoctónia	<i>Rhizoctonia sp</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Abóbora-almiscarada	<i>Cucurbita moschata</i>	-	A+P	Rizoctónia	<i>Rhizoctonia sp</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Abóbora-porqueta	<i>Cucurbita pepo</i>	-	A+P	Rizoctónia	<i>Rhizoctonia sp</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Aboborinha (courgette)	<i>Cucurbita pepo var. gironomatina</i>	-	A+P	Rizoctónia	<i>Rhizoctonia sp</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Morangueiro	<i>Fragaria x ananassa</i>	-	A+P	Podridão-do-colo-da-raiz	<i>Phytophthora cactum</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	Aplicação generalizada à superfície do solo desde a plantação até ao final da floração, mas antes do desenvolvimento do fruto (BBCH 59)	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Morangueiro	<i>Fragaria x ananassa</i>	-	A+P	Murchidão-des-pilículas	<i>Phytophthora sp.</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	Aplicação generalizada à superfície do solo desde a plantação até ao final da floração, mas antes do desenvolvimento do fruto (BBCH 59)	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Morangueiro	<i>Fragaria x ananassa</i>	-	A+P	Rizoctónia	<i>Rhizoctonia sp</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	Aplicação generalizada à superfície do solo desde a plantação até ao final da floração, mas antes do desenvolvimento do fruto (BBCH 59)	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Morangueiro	<i>Fragaria x ananassa</i>	-	A+P	Oídio	<i>Podospheuma macularis</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações após o aparecimento dos primeiros sintomas, em condições favoráveis à doença	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Canabis	<i>Cannabis sativa</i>	-	A+P	Podridão-cinzenta	<i>Botryotinia fuckeliana</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações após o aparecimento dos primeiros sintomas, em condições favoráveis à doença	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-cabaça)	<i>Lagenaria siceraria</i>	-	A+P	Oídio	<i>Goleovomyces cichoracearum Sphaerotheca fuliginea</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-chila)	<i>Cucurbita ficifolia</i>	-	A+P	Oídio	<i>Goleovomyces cichoracearum Sphaerotheca fuliginea</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-cabaça)	<i>Lagenaria siceraria</i>	-	A+P	Alternariose	<i>Alternaria cucumerina</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-chila)	<i>Cucurbita ficifolia</i>	-	A+P	Alternariose	<i>Alternaria cucumerina</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-cabaça)	<i>Lagenaria siceraria</i>	-	A+P	Rizoctónia	<i>Rhizoctonia sp</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-chila)	<i>Cucurbita ficifolia</i>	-	A+P	Rizoctónia	<i>Rhizoctonia sp</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-cabaça)	<i>Lagenaria siceraria</i>	-	A+P	Cancro gomoso	<i>Stagonosporopsis cucurbitacearum</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-chila)	<i>Cucurbita ficifolia</i>	-	A+P	Cancro gomoso	<i>Stagonosporopsis cucurbitacearum</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Allce	<i>Lactuca sativa</i>	baby leaf (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A+P	Podridão-branca	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloliquefaciens estirpe MBI 600	Iniciar os tratamentos previamente e a partir das primeiras folhas verdadeiras até à colheita (BBCH 01-18)	5 / -5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MENORES (a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	Ar Livre / Protegida / Interior	Inimigo / Efeito alérgico	Nome Científico	Requerente do UM	Designação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/Intensidade (mín-máx) (dias)	Volume de Cálculo (mín-máx)	Dose (mín-máx)	L. de Segurança de Retenção (dias)	Cond. e Restrições Específicas
Alface	<i>Lactuca sativa</i>	baby leaf (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A+P	Sclerotinia	<i>Sclerotinia minor</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar os tratamentos preventivamente a partir das primeiras folhas verdadeiras até 4 colheita (BBCH 01-18)	5 / - 5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Rúcula	<i>Eruca vesicaria subsp. sativa</i>	baby leaf (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A+P	Podridão-branca	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar os tratamentos preventivamente a partir das primeiras folhas verdadeiras até 4 colheita (BBCH 01-18)	5 / - 5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Rúcula	<i>Eruca vesicaria subsp. sativa</i>	baby leaf (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A+P	Sclerotinia	<i>Sclerotinia minor</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar os tratamentos preventivamente a partir das primeiras folhas verdadeiras até 4 colheita (BBCH 01-18)	5 / - 5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Espinafre	<i>Spinacia oleracea</i>	baby leaf (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A+P	Podridão-branca	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar os tratamentos preventivamente a partir das primeiras folhas verdadeiras até 4 colheita (BBCH 01-18)	5 / - 5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Espinafre	<i>Spinacia oleracea</i>	baby leaf (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A+P	Sclerotinia	<i>Sclerotinia minor</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar os tratamentos preventivamente a partir das primeiras folhas verdadeiras até 4 colheita (BBCH 01-18)	5 / - 5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Rúcula-selvagem	<i>Diploxis tenuifolia</i>	baby leaf (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A+P	Podridão-branca	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar os tratamentos preventivamente a partir das primeiras folhas verdadeiras até 4 colheita (BBCH 01-18)	5 / - 5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Rúcula-selvagem	<i>Diploxis tenuifolia</i>	baby leaf (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A+P	Sclerotinia	<i>Sclerotinia minor</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar os tratamentos preventivamente a partir das primeiras folhas verdadeiras até 4 colheita (BBCH 01-18)	5 / - 5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Alface	<i>Lactuca sativa</i>	baby leaf (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A+P	Podridão-cinzenta	<i>Botrytis fuckeliana</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar os tratamentos preventivamente a partir das primeiras folhas verdadeiras até 4 colheita (BBCH 01-18)	5 / - 5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Rúcula	<i>Eruca vesicaria subsp. sativa</i>	baby leaf (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A+P	Podridão-cinzenta	<i>Botrytis fuckeliana</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar os tratamentos preventivamente a partir das primeiras folhas verdadeiras até 4 colheita (BBCH 01-18)	5 / - 5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Rúcula-selvagem	<i>Diploxis tenuifolia</i>	baby leaf (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A+P	Podridão-cinzenta	<i>Botrytis fuckeliana</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar os tratamentos preventivamente a partir das primeiras folhas verdadeiras até 4 colheita (BBCH 01-18)	5 / - 5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Espinafre	<i>Spinacia oleracea</i>	baby leaf (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A+P	Podridão-cinzenta	<i>Botrytis fuckeliana</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar os tratamentos preventivamente a partir das primeiras folhas verdadeiras até 4 colheita (BBCH 01-18)	5 / - 5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Alface	<i>Lactuca sativa</i>	baby leaf (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A+P	Rizoctonia	<i>Thanatephorus solani</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar os tratamentos preventivamente a partir das primeiras folhas verdadeiras até 4 colheita (BBCH 01-18)	5 / - 5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Rúcula	<i>Eruca vesicaria subsp. sativa</i>	baby leaf (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A+P	Rizoctonia	<i>Thanatephorus solani</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar os tratamentos preventivamente a partir das primeiras folhas verdadeiras até 4 colheita (BBCH 01-18)	5 / - 5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Rúcula-selvagem	<i>Diploxis tenuifolia</i>	baby leaf (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A+P	Rizoctonia	<i>Thanatephorus solani</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar os tratamentos preventivamente a partir das primeiras folhas verdadeiras até 4 colheita (BBCH 01-18)	5 / - 5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Espinafre	<i>Spinacia oleracea</i>	baby leaf (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A+P	Rizoctonia	<i>Thanatephorus solani</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar os tratamentos preventivamente a partir das primeiras folhas verdadeiras até 4 colheita (BBCH 01-18)	5 / - 5	200 - 300 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo até 5 aplicações por ciclo cultural, no conjunto dos inimigos
Couve-coração	<i>Brassica oleracea var. capitata f. conica</i>	-	A	Estenfilose	<i>Stemphylium sp.</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Tratar preventivamente entre o aparecimento dos botões florais e a queda das folhas. (BBCH 55-98)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-flor	<i>Brassica oleracea var. botrytis</i>	-	A	Estenfilose	<i>Stemphylium sp.</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Tratar preventivamente entre o aparecimento dos botões florais e a queda das folhas. (BBCH 55-98)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-de-bruxelas	<i>Brassica oleracea var. gemmifera</i>	-	A	Bacterioses	<i>Pseudomonas sp. Xanthomonas sp.</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Realizar aplicações preventivamente desde o início da formação da cabeça quando o tempo decora húmido ou chuvoso. (BBCH 41-48)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-repicho	<i>Brassica oleracea var. capitata f. alta</i>	-	A	Bacterioses	<i>Pseudomonas sp. Xanthomonas sp.</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Realizar aplicações preventivamente desde o início da formação da cabeça quando o tempo decora húmido ou chuvoso. (BBCH 41-48)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-lombarda	<i>Brassica oleracea var. sabauda</i>	-	A	Bacterioses	<i>Pseudomonas sp. Xanthomonas sp.</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Realizar aplicações preventivamente desde o início da formação da cabeça quando o tempo decora húmido ou chuvoso. (BBCH 41-48)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-rosa	<i>Brassica oleracea var. capitata f. rubra</i>	-	A	Bacterioses	<i>Pseudomonas sp. Xanthomonas sp.</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Realizar aplicações preventivamente desde o início da formação da cabeça quando o tempo decora húmido ou chuvoso. (BBCH 41-48)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-coração	<i>Brassica oleracea var. capitata f. conica</i>	-	A	Bacterioses	<i>Pseudomonas sp. Xanthomonas sp.</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Realizar aplicações preventivamente desde o início da formação da cabeça quando o tempo decora húmido ou chuvoso. (BBCH 41-48)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Couve-flor	<i>Brassica oleracea var. botrytis</i>	-	A	Bacterioses	<i>Pseudomonas sp. Xanthomonas sp.</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Realizar aplicações preventivamente desde o início da formação da cabeça quando o tempo decora húmido ou chuvoso. (BBCH 41-48)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Envilheira	<i>Psium sativum</i>	-	A	Sclerotinia	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Tratar preventivamente desde as 3 folhas verdadeiras. (BBCH 13-89)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Amendim	<i>Arachis hypogaea</i>	-	A	Sclerotinia	<i>Sclerotinia sp.</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Tratar preventivamente desde as 3 folhas verdadeiras. (BBCH 13-89)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Envilheira	<i>Psium sativum</i>	-	A	Ascoquita	<i>Didymella psii</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Tratar preventivamente desde as 3 folhas verdadeiras. (BBCH 13-89)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Envilheira	<i>Psium sativum</i>	-	A	Antracnose	<i>Glomerella cingulata</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Tratar preventivamente desde as 3 folhas verdadeiras. (BBCH 13-89)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.
Melero	<i>Cucumis melo</i>	-	A	Oídio	<i>Gulabomyces cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Tratar preventivamente desde as 5 folhas verdadeiras. (BBCH 13-89)	6 / - 5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura, no conjunto dos inimigos.

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MENORES																	
(a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	Ar Livre / Protegida / Interior	Inimigo / Efeito alvo(a)	Nome Científico	Requerente do UM	Designação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/Intensidade (min-máx) (dias)	Volume de Cálculo (min-máx)	Dose (min-máx)	L de Segurança de Reentrada (dias)	Cond. e Restrições Específicas
Melancia	<i>Citrullus lanatus</i>	-	A	Oídio	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar preventivamente desde as 5 folhas verdadeiras (BSC1 13-89)	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Pepino	<i>Cucumis sativus</i>	-	A+P	Oídio	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar os tratamentos preventivamente, em condições de baixo a moderado ataque da doença, desde as 5 folhas verdadeiras até à colheita (BCH15-89)	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-mexicana)	<i>Cucurbita maxima</i>	-	A+P	Oídio	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar os tratamentos preventivamente, em condições de baixo a moderado ataque da doença, desde as 5 folhas verdadeiras até à colheita (BCH15-89)	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-americana)	<i>Cucurbita moschata</i>	-	A+P	Oídio	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar os tratamentos preventivamente, em condições de baixo a moderado ataque da doença, desde as 5 folhas verdadeiras até à colheita (BCH15-89)	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-porquetra)	<i>Cucurbita pepo</i>	-	A+P	Oídio	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar os tratamentos preventivamente, em condições de baixo a moderado ataque da doença, desde as 5 folhas verdadeiras até à colheita (BCH15-89)	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Morangueiro	<i>Fragaria x ananassa</i>	-	A+P	Podridão-do-colo-e-das-raízes	<i>Phytophthora cactorum</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Morangueiro	<i>Fragaria x ananassa</i>	-	A+P	Murchidão-das-plântulas	<i>Phytophthora</i> sp.	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Morangueiro	<i>Fragaria x ananassa</i>	-	A+P	Rizoctónia	<i>Rhizoctonia</i> sp	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Morangueiro	<i>Fragaria x ananassa</i>	-	A+P	Oídio	<i>Podospheeria macularis</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Canabim (medicinal)	<i>Cannabis</i> sp.	-	A+P	Podridão-cinzenta	<i>Botrytis cinerea</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-chia)	<i>Cucurbita ficifolia</i>	-	A+P	Oídio	<i>Golovinomyces cichoracearum</i> <i>Sphaerotheca fuliginea</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Aplicação generalizada à superfície do solo desde a plantação até ao final da floração, mas antes do desenvolvimento do fruto (BBCH 69)	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-cabaça)	<i>Lagenaria siceraria</i>	-	A+P	Alternação	<i>Alternaria cucumerina</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Aplicação generalizada à superfície do solo desde a plantação até ao final da floração, mas antes do desenvolvimento do fruto (BBCH 69)	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-chia)	<i>Cucurbita ficifolia</i>	-	A+P	Alternação	<i>Alternaria cucumerina</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Aplicação generalizada à superfície do solo desde a plantação até ao final da floração, mas antes do desenvolvimento do fruto (BBCH 69)	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-cabaça)	<i>Lagenaria siceraria</i>	-	A+P	Rizoctónia	<i>Rhizoctonia</i> sp	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações após o aparecimento dos primeiros sintomas, em condições favoráveis à doença.	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Abóbora (abóbora-chia)	<i>Cucurbita ficifolia</i>	-	A+P	Rizoctónia	<i>Rhizoctonia</i> sp	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações após o aparecimento dos primeiros sintomas, em condições favoráveis à doença.	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Alface	<i>Lactuca sativa</i>	baby leaf (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A+P	Podridão-branca	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Alface	<i>Lactuca sativa</i>	baby leaf (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A+P	Sclerotinia	<i>Sclerotinia minor</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Rúcula	<i>Eruca vesicaria subsp. sativa</i>	baby leaf (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A+P	Podridão-branca	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Rúcula	<i>Eruca vesicaria subsp. sativa</i>	baby leaf (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A+P	Sclerotinia	<i>Sclerotinia minor</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Espinafre	<i>Spinacia oleracea</i>	baby leaf (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A+P	Podridão-branca	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.
Espinafre	<i>Spinacia oleracea</i>	baby leaf (colheita até 6-8 folhas verdadeiras)	A+P	Sclerotinia	<i>Sclerotinia minor</i>	BASF	SERIFEL	AV	1286	Fungicida	Bacillus amyloquelicifaciens estirpe MBI 600	Iniciar as aplicações ao aparecimentos primeiros sintomas, quando as plantas apresentem 3-5 folhas definitivas.	6 / -5	200 - 1000 L/ha	0,5 kg/ha	1 / -	Máximo 6 aplicações por cultura , no conjunto dos inimigos.