

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MELHORES (a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	Ar Livre / Protegida / Interior	Inimigo / Efeito a evitar	Nome Científico	Requerido do UM	Designação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/Intervalo (mín-máx) (dias)	Volume de Cálculo (mín-máx)	Dose (mín-máx)	L de Segurança/ de Reentrada (dias)	Condi. e Restrições Específicas
Couve-repolho Couve-coração Couve-rosa	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>alba</i> / <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>conica</i> / <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>rubra</i>	Baby-leaf		esterilfície	<i>Stemphylium</i> sp.	CAPOSOL	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina		- / -			14 ar livre / -	Máximo 2 tratamentos com este e outros Qel ou SDHI. Horticultura de ar livre SPe3=5 m
Marmeleiro	<i>Citrusn oblonga</i>	-		monilíose	<i>Monilia</i> sp.	APAS - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DA SOBREIRA	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina		- / -	700 - 1000 L/ha		7 / -	Máx. 3 tratamentos com este p.c. (7-10 dias de intervalo entre tratamentos) ou outros fungicidas contendo Qel ou SDHI. Aplicar a partir da porta verde, quando as condições forem favoráveis à doença. SPe3 = 20m
Couve-flor	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>	-	A	Esterilfície	<i>Stemphylium</i> sp.	-	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou, ao aparecimento dos primeiros sintomas.	2 / 7 - 10	1000 L/ha	1000 g/ha	14 / -	Utilizar no máximo 1 kg de produto comercial por hectare. Máximo dois tratamentos, por ciclo vegetativo, com este ou outro produto com o mesmo modo de ação (SDHI) e/ou (Qel). Respeitar uma zona não pulverizada de 5m em relação às águas de superfície.
Couve-brócolos	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	-	A	Esterilfície	<i>Stemphylium</i> sp.	-	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou, ao aparecimento dos primeiros sintomas.	2 / 7 - 10	1000 L/ha	1000 g/ha	14 / -	Utilizar no máximo 1 kg de produto comercial por hectare. Máximo dois tratamentos, por ciclo vegetativo, com este ou outro produto com o mesmo modo de ação (SDHI) e/ou (Qel). Respeitar uma zona não pulverizada de 5m em relação às águas de superfície.
Couve-repolho Couve-coração Couve-rosa Couve-lombarda	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>alba</i> / <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>conica</i> / <i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>rubra</i> / <i>Brassica oleracea</i> var. <i>sabauda</i>	-	A	Esterilfície	<i>Stemphylium</i> sp.	-	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou, ao aparecimento dos primeiros sintomas.	2 / 7 - 10	1000 L/ha	1000 g/ha	14 / -	Utilizar no máximo 1 kg de produto comercial por hectare. Máximo dois tratamentos, por ciclo vegetativo, com este ou outro produto com o mesmo modo de ação (SDHI) e/ou (Qel). Respeitar uma zona não pulverizada de 5m em relação às águas de superfície.
Acelga	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>ocea</i>	Baby-leaf (caheta até 6-8 folhas verdadeiras)	A	Cercosporíose	<i>Cercospora beticola</i>	-	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou, ao aparecimento dos primeiros sintomas.	2 / 7 - 10	200 - 400 L/ha	1500 g/ha	14 / -	Máximo dois tratamentos, por ciclo vegetativo, com este ou outro produto com o mesmo modo de ação (SDHI) e/ou (Qel). Respeitar uma zona não pulverizada de 5m em relação às águas de superfície.
Amora-silvestre	<i>Rubus fruticosus</i>	-	A	Podridão cinzenta	<i>Botrytis cinerea</i>	-	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou, ao aparecimento dos primeiros sintomas.	2 / 7 - 10	1000 L/ha	1500 g/ha	3 / -	Máximo de 1,5 kg de produto comercial por hectare. Apenas está autorizado para ar livre. Máximo dois tratamentos, por ciclo vegetativo, com este ou outro produto com o mesmo modo de ação (SDHI) e/ou (Qel). Respeitar uma zona não pulverizada de 5m em relação às águas de superfície.
Mirtilo-azul (saurando-azul)	<i>Vaccinium corymbosum</i> (incl. híbridos)	-	A	Podridão cinzenta	<i>Botrytis cinerea</i>	-	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou, ao aparecimento dos primeiros sintomas.	2 / 7 - 10	1000 L/ha	1500 g/ha	3 / -	Máximo de 1,5 kg de produto comercial por hectare. Apenas está autorizado para ar livre. Máximo dois tratamentos, por ciclo vegetativo, com este ou outro produto com o mesmo modo de ação (SDHI) e/ou (Qel). Respeitar uma zona não pulverizada de 5m em relação às águas de superfície.
Framboesa	<i>Rubus idaeus</i>	-	A	Podridão cinzenta	<i>Botrytis cinerea</i>	-	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou, ao aparecimento dos primeiros sintomas.	2 / 7 - 10	1000 L/ha	1500 g/ha	3 / -	Máximo de 1,5 kg de produto comercial por hectare. Apenas está autorizado para ar livre. Máximo dois tratamentos, por ciclo vegetativo, com este ou outro produto com o mesmo modo de ação (SDHI) e/ou (Qel). Respeitar uma zona não pulverizada de 5m em relação às águas de superfície.
Alface-de-cordero (scarabregos)	<i>Vitisvinella rotundifolia</i>	Baby-leaf	P	Podridão cinzenta	<i>Botrytis cinerea</i>	Iberian Salats Agricultura SA Quinta dos Cativos - Boavista dos Pinheiros 7630-033 Odemira	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	00-18. Tratar preventivamente ao aparecimento dos primeiros sintomas ou em condições favoráveis à doença.	1 / -	1000 L/ha	1,5 kg/ha	14 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, não realizar mais de 2 tratamentos por ano com este fungicida ou outro contendo Qel ou SDHI. Alternar com outros modos de ação.
Escarola (incluindo: frásada, chicória-de-folha-larga)	<i>Cichorium endivia</i>	Grupo I	A	Podridão cinzenta	<i>Botrytis</i> sp.	Iberian Salats Agricultura SA Quinta dos Cativos - Boavista dos Pinheiros 7630-033 Odemira	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	00-49. Tratar preventivamente ao aparecimento dos primeiros sintomas ou em condições favoráveis à doença.	2 / 7 - 10	1000 L/ha	1,5 kg/ha	14 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, não realizar mais de 2 tratamentos por ano com este fungicida ou outro contendo Qel ou SDHI. Alternar com outros modos de ação.
Escarola (incluindo: frásada, chicória-de-folha-larga)	<i>Cichorium endivia</i>	Grupo I	P	Podridão cinzenta	<i>Botrytis</i> sp.	Iberian Salats Agricultura SA Quinta dos Cativos - Boavista dos Pinheiros 7630-033 Odemira	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	00-49. Tratar preventivamente ao aparecimento dos primeiros sintomas ou em condições favoráveis à doença.	1 / -	1000 L/ha	1,5 kg/ha	21 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, não realizar mais de 2 tratamentos por ano com este fungicida ou outro contendo Qel ou SDHI. Alternar com outros modos de ação.
Funcho	<i>Foeniculum vulgare</i>	Funcho de folhas	A+P	Esclerotinia	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>	Iberian Salats Agricultura SA Quinta dos Cativos - Boavista dos Pinheiros 7630-033 Odemira	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	Tratar preventivamente ao aparecimento dos primeiros sintomas ou em condições favoráveis à doença.	2 / 7 - 10	1000 L/ha	1,5 kg/ha	14 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, não realizar mais de 2 tratamentos por ano com este fungicida ou outro contendo Qel ou SDHI. Alternar com outros modos de ação.
Salva	<i>Sativa officinalis</i>	Grupo I	P	Podridão cinzenta	<i>Botrytis cinerea</i>	Iberian Salats Agricultura SA Quinta dos Cativos - Boavista dos Pinheiros 7630-033 Odemira	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	Tratar preventivamente ao aparecimento dos primeiros sintomas ou em condições favoráveis à doença.	2 / 7 - 10	1000 L/ha	1,5 kg/ha	14 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, não realizar mais de 2 tratamentos por ano com este fungicida ou outro contendo Qel ou SDHI. Alternar com outros modos de ação.

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MENORES (a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																		
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	Ar Livre / Protegida / Interior	Trinigo / Efeito alérgico	Nome Científico	Requerente do UEM	Designação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/Intervalo (min-máx) (dias)	Volume de Cálculo (min-máx)	Dose (min-máx)	L de Segurança/ de Reentrada (dias)	Cond. e Restrições Específicas	
Rúcula-selvagem	<i>Diplazis tenuifolia</i>	Baby-leaf	A+P		Esclerotinia	Sclerotinia sclerotiorum	Iberian Salads Agricultura SA Quinta dos Cativos - Boavista dos Pinheiros 7630-033 Odemira	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	00-18, tratar preventivamente ao aparecimento dos primeiros sintomas ou em condições favoráveis à doença	2 / 7 - 10	1000 L/ha	1,5 kg/ha	14 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, não realizar mais de 2 tratamentos por ano com este fungicida ou outro contendo Qel ou SDHI. Alternar com outros modos de ação.
Aneto (=endro)	<i>Anethum graveolens</i>	Grupo I	A+P		Podridão cinzenta	Botrytis sp.	Iberian Salads Agricultura SA Quinta dos Cativos - Boavista dos Pinheiros 7630-033 Odemira	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	tratar preventivamente ao aparecimento dos primeiros sintomas ou em condições favoráveis à doença	2 / 7 - 10	1000 L/ha	1,5 kg/ha	14 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, não realizar mais de 2 tratamentos por ano com este fungicida ou outro contendo Qel ou SDHI. Alternar com outros modos de ação.
Funcho	<i>Foeniculum vulgare</i>	Funcho de folhas	A		Esclerotinia	Sclerotinia sclerotiorum	Iberian Salads Agricultura SA Quinta dos Cativos - Boavista dos Pinheiros 7630-033 Odemira	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	Tratar preventivamente, em condições favoráveis à doença ou ao aparecimento dos primeiros sintomas - Até BBCH 49	2 / 7 - 10	1000 L/ha	1,5 kg/ha	14 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, não realizar mais de 2 tratamentos por ano com este fungicida ou outros contendo Qel ou SDHI. Alternar com fungicidas com outros modos de ação.
Couve-brócolo	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	-	A		Alternaria	Alternaria brassicicola	Moniz, Produtos Alimentares do Montego e Lda, S.A. Zona Industrial, Rua E - Apartado 30 2091-901 ALPARAÇA	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	Tratar preventivamente, ao aparecimento dos primeiros sintomas (BBCH 33-49)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	0,2 - 1 kg/ha	14 / -	Máximo 2 tratamentos com este produto ou outros fungicidas que contenham Qel e/ou SDHI.
Nogueira	<i>Juglans regia</i>	-	A		antracnose	Glomeria leptostydia	BASF Portuguesa S.A. Rua 25 Abril n.º 1 2685-538 Póvoa Velha	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	Tratar preventivamente, desde o início da floração (BBCH 61-79)	2 / 10 - 15	600 - 1500 L/ha	1 kg/ha	28 / -	Máximo de 2 tratamentos por ano com este ou outros fungicidas do grupo Qel e/ou SDHI. Alternar com produtos com diferente modo de ação.
Groseira	<i>Ribes sp.</i>	-	A		podridão cinzenta	Botrytis cinerea	Fresh Fruit, Produção e Comercialização Unipessoal Lda, Fais - Fintas de Transil, 7630 - 068 Odemira.	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	Tratar preventivamente, desde que se verifiquem as condições favoráveis ao desenvolvimento da doença	2 / 7 - 10	- 1000 L/ha	1,5 kg/ha	3 / -	Máximo 2 tratamentos com este produto ou outros fungicidas que contenham Qel e/ou SDHI.
Feno-grupo (=fenacho)	<i>Trigonella foenum-graecum</i>	-	A+P		Podridões	Botrytis cinerea	Fresh Cut, Lda - Sítio da Campina CP951-C 8800-107 Luz de Tavira	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	Primeiras folhas verdadeiras, em condições favoráveis ao aparecimento da doença	2 / 7 - 10	1000 L/ha	1,5 kg/ha	14 / 1	Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou outros fungicidas que contenham Qel e/ou SDHI em mais do que 2 tratamentos por época vegetativa em feno-grupo.
Espinafre	<i>Spinacia oleracea</i>	-	A		Mídio	Pezizomyces spicariae	CAMPOTEC, COMERCIALIZAÇÃO E CONSULTADORA EM HORTIFRUTICOLAS, S.A. EN. nº 9, Zona Industrial Casalinhos de Alaiata, 2560 - 393 SILVEIRA I	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	-	2 / 7 - 10	400 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou outros fungicidas que contenham Qel e/ou SDHI em mais do que 2 tratamentos por época vegetativa.
Espinafre	<i>Spinacia oleracea</i>	-	A		Antracnose	Colletotrichum dematium	CAMPOTEC, COMERCIALIZAÇÃO E CONSULTADORA EM HORTIFRUTICOLAS, S.A. EN. nº 9, Zona Industrial Casalinhos de Alaiata, 2560 - 393 SILVEIRA I	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas.	2 / 7 - 10	400 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou outros fungicidas que contenham Qel e/ou SDHI em mais do que 2 tratamentos por época vegetativa.
Ervilheira	<i>Pisum sativum</i>	-	A		Esclerotinia	Sclerotinia sclerotiorum	Bonduelle (Portugal) - Agrodionisa, S.A. Zona Industrial de Santarém 2005-002 Várzea STR	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	Tratar, ao aparecimento dos primeiros sintomas, entre o início e o fim da floração. Não aplicar após o fim da floração	2 / 7 - 10	400 - 1000 L/ha	1 - 1,5 kg/ha	- / -	Máximo dois tratamentos, por ciclo vegetativo, com este ou outro produto com o mesmo modo de ação (SDHI) e/ou (Qel).
Ervilheira	<i>Pisum sativum</i>	-	A		Ascoquiza	Ascochyta sp.	Bonduelle (Portugal) - Agrodionisa, S.A. Zona Industrial de Santarém 2005-002 Várzea STR	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	Tratar, ao aparecimento dos primeiros sintomas, entre o início e o fim da floração. Não aplicar após o fim da floração	2 / 7 - 10	400 - 1000 L/ha	1 - 1,5 kg/ha	- / -	Máximo dois tratamentos, por ciclo vegetativo, com este ou outro produto com o mesmo modo de ação (SDHI) e/ou (Qel).
Espinafre	<i>Spinacia oleracea</i>	Baby-leaf	A+P		Esclerotinia	Sclerotinia sclerotiorum	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	BBCH 10-17; tratar em condições favoráveis ao aparecimento da doença (tempo húmido e chuvoso)	2 / 7 - 10	1000 L/ha	1,5 kg/ha	14 / -	Utilizar o intervalo mais curto (7 dias) em condições de maior pressão da doença. Realizar no máximo 2 aplicações por ciclo cultural (conjunto das doenças), com este ou outro Qel e/ou SDHI. Este fungicida deverá ser utilizado em alternância com fungicidas de diferente modo de ação.
Alface	<i>Lactuca sativa</i>	(baby-leaf)	A+P		Esclerotinia	Sclerotinia sclerotiorum	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	BBCH 10-17; tratar em condições favoráveis ao aparecimento da doença (tempo húmido e chuvoso)	2 / 7 - 10	1000 - 800 L/ha	1,5 kg/ha	14 / -	Utilizar o intervalo mais curto (7 dias) em condições de maior pressão da doença. Realizar no máximo 2 aplicações por ciclo cultural (conjunto das doenças), com este ou outro Qel e/ou SDHI. Este fungicida deverá ser utilizado em alternância com fungicidas de diferente modo de ação.
Salsa-de-raiz-grossa	<i>Petroselinum crispum</i> var. <i>tuberosum</i>	-	A		Alternaria	Alternaria sp.	CAMPOSOL II, Lda Herdade dos Nascedos, EN 393, KM 6, APT 123, 7645-909 Vila Nova de Milfontes	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	tratar preventivamente em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença (BBCH 41 a 49)	2 / 7 - 10	600 - 1000 L/ha	0,75 kg/ha	14 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou outros fungicidas que contenham Qel e/ou SDHI em mais do que 2 tratamentos por época vegetativa em salsa de raiz grossa.
Salsa-de-raiz-grossa	<i>Petroselinum crispum</i> var. <i>tuberosum</i>	-	A		Podridão branca	Sclerotinia sp.	CAMPOSOL II, Lda Herdade dos Nascedos, EN 393, KM 6, APT 123, 7645-909 Vila Nova de Milfontes	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalíde + piraclostrobina	tratar preventivamente em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença (BBCH 41 a 49)	2 / 7 - 10	600 - 1000 L/ha	0,75 kg/ha	14 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou outros fungicidas que contenham Qel e/ou SDHI em mais do que 2 tratamentos por época vegetativa em salsa de raiz grossa.

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MENORES (a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	Ar Livre / Protegida / Interior	Inimigo / Efeito alérgico	Nome Científico	Requerente do UM	Designação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/tratante (mín-máx) (dias)	Volume de Cálculo (mín-máx)	Dose (mín-máx)	L de Segurança de Reentrada (dias)	Cond. e Restrições Específicas
Alho-poró (alho-francês)	<i>Allium porum</i>	-	A	Queima das folhas	<i>Botrytis squamosa</i>	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença (BBCH 3 - 45/47)	2 / 7 - 14	400 - 1000 L/ha	1 - 1,5 kg/ha	21 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou outros fungicidas que contenham Qel e/ou SDHI em mais do que 2 tratamentos por época vegetativa em alho poró.
Apo (caule)	<i>Apium graveolens var dulce</i>	-	A	Cercosporiose	<i>Cercospora</i> sp.	CAMPUSOL II, Lda Herdade dos Nascidos, EN 393, KM 6, APT 1 23, 7645, 909 Vila Nova de Milfontes.	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença	2 / 7 - 10	600 - 1000 L/ha	0,75 - 1,5 kg/ha	14 / -	-
Apo (caule)	<i>Apium graveolens var dulce</i>	-	A	Septoríose	<i>Septoria</i> sp.	CAMPUSOL II, Lda Herdade dos Nascidos, EN 393, KM 6, APT 1 23, 7645, 909 Vila Nova de Milfontes.	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença	2 / 7 - 10	600 - 1000 L/ha	0,75 - 1,5 kg/ha	14 / -	-
Ornamentais para produção de folha, flor e/ou fruto (de corte e/ou em vaso)	-	-	A+P	Podridão cinzenta	<i>Botrytis cinerea</i>	APPPFN	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença	2 / 7 - 10	1000 L/ha	1,5 - 1,8 kg/ha	- / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou outros fungicidas que contenham Qel e/ou SDHI em mais do que 2 tratamentos por época vegetativa.
Amora-silvestre	<i>Rubus fruticosus</i>	-	A	Podridão cinzenta	<i>Botrytis cinerea</i>	Lusomorange, SA (Apartado 66, 7630-908 S. Teotónio)	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas	2 / 7 - 10	1000 L/ha	- 1,5 kg/ha	3 / -	Máximo 2 tratamentos por ciclo cultural, com este ou 1 outro produto contendo Qel e/ou SDHI
Framboesa	<i>Rubus idaeus</i>	-	A	Podridão cinzenta	<i>Botrytis cinerea</i>	Lusomorange, SA (Apartado 66, 7630-908 S. Teotónio)	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas	2 / 7 - 10	1000 L/ha	- 1,5 kg/ha	3 / -	Máximo 2 tratamentos por ciclo cultural, com este ou 1 outro produto contendo Qel e/ou SDHI
Amora-silvestre	<i>Rubus fruticosus</i>	-	P	Podridão cinzenta	<i>Botrytis cinerea</i>	Lusomorange, SA (Apartado 66, 7630-908 S. Teotónio)	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas	2 / 7 - 10	1000 L/ha	- 1,25 kg/ha	3 / -	Máximo 2 tratamentos por ciclo cultural, com este ou 1 outro produto contendo Qel e/ou SDHI
Framboesa	<i>Rubus idaeus</i>	-	P	Podridão cinzenta	<i>Botrytis cinerea</i>	Lusomorange, SA (Apartado 66, 7630-908 S. Teotónio)	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas	2 / 7 - 10	1000 L/ha	- 1,25 kg/ha	3 / -	Máximo 2 tratamentos por ciclo cultural, com este ou 1 outro produto contendo Qel e/ou SDHI
Salsa	<i>Petroselinum crispum</i>	consumo da folha (planta aromática fresca)	A	Podridão	<i>Botrytis</i> sp.	Quinta Fresca Lda, Rua da Anunciada, S/N, 8950-414 Albufeira, Castro Marim, Faro, Portugal	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ao aparecimento dos primeiros sintomas ou em condições favoráveis à doença	2 / 7 - 10	1000 L/ha	1,5 kg/ha	14 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou outros fungicidas que contenham Qel e/ou SDHI em mais do que 2 tratamentos por época vegetativa.
Coentros	<i>Coriandrum sativum</i>	consumo da folha (planta aromática fresca)	A	Podridão	<i>Botrytis</i> sp.	Quinta Fresca Lda, Rua da Anunciada, S/N, 8950-414 Albufeira, Castro Marim, Faro, Portugal	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ao aparecimento dos primeiros sintomas ou em condições favoráveis à doença	2 / 7 - 10	1000 L/ha	1,5 kg/ha	14 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou outros fungicidas que contenham Qel e/ou SDHI em mais do que 2 tratamentos por época vegetativa.
Couve-brócolos	<i>Brassica oleracea var italica</i>	-	-	Mancha-das-folhas	<i>Mycosphaella brassicicola</i>	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Máximo 2 tratamentos por cultura com este produto ou outros fungicidas contendo Qel e/ou SDHI
Couve-repolho	<i>Brassica oleracea var capitata f. alba</i>	-	-	Mancha-das-folhas	<i>Mycosphaella brassicicola</i>	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas (BBCH 15-49)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Máximo 2 tratamentos por cultura com este produto ou outros fungicidas contendo Qel e/ou SDHI
Couve-repolho	<i>Brassica oleracea var capitata f. alba</i>	-	-	Alternariose	<i>Alternaria brassicae</i> <i>Alternaria brassicicola</i>	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas (BBCH 15-49)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Máximo 2 tratamentos por cultura com este produto ou outros fungicidas contendo Qel e/ou SDHI
Couve-repolho	<i>Brassica oleracea var capitata f. alba</i>	-	-	Estenfiliose	<i>Stemphylium</i> sp.	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas (BBCH 15-49)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Máximo 2 tratamentos por cultura com este produto ou outros fungicidas contendo Qel e/ou SDHI
Couve-lombarda	<i>Brassica oleracea var sabauda</i>	-	-	Mancha-das-folhas	<i>Mycosphaella brassicicola</i>	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas (BBCH 15-49)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Máximo 2 tratamentos por cultura com este produto ou outros fungicidas contendo Qel e/ou SDHI
Couve-lombarda	<i>Brassica oleracea var sabauda</i>	-	-	Alternariose	<i>Alternaria brassicae</i> <i>Alternaria brassicicola</i>	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas (BBCH 15-49)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Máximo 2 tratamentos por cultura com este produto ou outros fungicidas contendo Qel e/ou SDHI
Couve-lombarda	<i>Brassica oleracea var sabauda</i>	-	-	Estenfiliose	<i>Stemphylium</i> sp.	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas (BBCH 15-49)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Máximo 2 tratamentos por cultura com este produto ou outros fungicidas contendo Qel e/ou SDHI
Couve-coração	<i>Brassica oleracea var capitata f. rubra</i>	-	-	Mancha-das-folhas	<i>Mycosphaella brassicicola</i>	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas (BBCH 15-49)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Máximo 2 tratamentos por cultura com este produto ou outros fungicidas contendo Qel e/ou SDHI
Couve-coração	<i>Brassica oleracea var capitata f. conica</i>	-	-	Alternariose	<i>Alternaria brassicae</i> <i>Alternaria brassicicola</i>	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas (BBCH 15-49)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Máximo 2 tratamentos por cultura com este produto ou outros fungicidas contendo Qel e/ou SDHI
Couve-coração	<i>Brassica oleracea var capitata f. conica</i>	-	-	Estenfiliose	<i>Stemphylium</i> sp.	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas (BBCH 15-49)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Máximo 2 tratamentos por cultura com este produto ou outros fungicidas contendo Qel e/ou SDHI
Couve-Rova	<i>Brassica oleracea var capitata f. rubra</i>	-	-	Mancha-das-folhas	<i>Mycosphaella brassicicola</i>	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas (BBCH 15-49)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Máximo 2 tratamentos por cultura com este produto ou outros fungicidas contendo Qel e/ou SDHI
Couve-Rova	<i>Brassica oleracea var capitata f. rubra</i>	-	-	Alternariose	<i>Alternaria brassicae</i> <i>Alternaria brassicicola</i>	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas (BBCH 15-49)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Máximo 2 tratamentos por cultura com este produto ou outros fungicidas contendo Qel e/ou SDHI
Couve-Rova	<i>Brassica oleracea var capitata f. rubra</i>	-	-	Estenfiliose	<i>Stemphylium</i> sp.	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas (BBCH 15-49)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Máximo 2 tratamentos por cultura com este produto ou outros fungicidas contendo Qel e/ou SDHI
Couve-flor	<i>Brassica oleracea var botrytis</i>	-	-	Mancha-das-folhas	<i>Mycosphaella brassicicola</i>	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas (BBCH 15-49)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Máximo 2 tratamentos por cultura com este produto ou outros fungicidas contendo Qel e/ou SDHI
Couve-flor	<i>Brassica oleracea var botrytis</i>	-	-	Alternariose	<i>Alternaria brassicae</i> <i>Alternaria brassicicola</i>	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas (BBCH 15-49)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Máximo 2 tratamentos por cultura com este produto ou outros fungicidas contendo Qel e/ou SDHI
Couve-de-Bruxelas	<i>Brassica oleracea var gemmifera</i>	-	-	Estenfiliose	<i>Stemphylium</i> sp.	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas (BBCH 15-49)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Máximo 2 tratamentos por cultura com este produto ou outros fungicidas contendo Qel e/ou SDHI
Couve-de-Bruxelas	<i>Brassica oleracea var gemmifera</i>	-	-	Mancha-das-folhas	<i>Mycosphaella brassicicola</i>	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas (BBCH 15-49)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Máximo 2 tratamentos por cultura com este produto ou outros fungicidas contendo Qel e/ou SDHI
Couve-de-Bruxelas	<i>Brassica oleracea var gemmifera</i>	-	-	Alternariose	<i>Alternaria brassicae</i> <i>Alternaria brassicicola</i>	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas (BBCH 15-49)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Máximo 2 tratamentos por cultura com este produto ou outros fungicidas contendo Qel e/ou SDHI
Couve-brócolos	<i>Brassica oleracea var italica</i>	-	-	Mancha-das-folhas	<i>Mycosphaella brassicicola</i>	Lusomorange, SA (Apartado 66, 7630-908 S. Teotónio)	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas	2 / 7 - 10	1000 L/ha	- 1,5 kg/ha	3 / -	Máximo 2 tratamentos por ciclo cultural, com este ou 1 outro produto contendo Qel e/ou SDHI

EXTENSÕES DE AUTORIZAÇÃO PARA AS UTILIZAÇÕES MENORES (a eficácia e a fitotoxicidade nestas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto)																	
Cultura	Nome Científico	Situação Particular	Ar Livre / Protegida / Interior	Inimigo / Efeito e/ou alérgico	Nome Científico	Requerente do UM	Designação Comercial	Autorização	Número	Função	Substância(s) Ativa(s)	Época ou Estado Fenológico	Nº Máximo/Intervalo (min-máx) (dias)	Volume de Cálculo (min-máx)	Dose (min-máx)	L. de Segurança/ de Reentrada (dias)	Cond. e Restrições Específicas
Couve-repolho	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata f. alba</i>	-	-	Mancha-das-folhas	<i>Mycosphaella brassicicola</i>	Lusomorange, SA (Apartado 66, 7630-908 S. Teotónio)	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas	2 / 7 - 10	1000 L/ha	- 1,5 kg/ha	3 / -	Máximo 2 tratamentos por ciclo cultural, com este ou 1 outro produto contendo Qel e ou SDHI
Couve-repolho	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata f. alba</i>	-	-	Alternariose	<i>Alternaria brassicae</i> / <i>Alternaria brassicicola</i>	Lusomorange, SA (Apartado 66, 7630-908 S. Teotónio)	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas	2 / 7 - 10	1000 L/ha	- 1,25 kg/ha	3 / -	Máximo 2 tratamentos por ciclo cultural, com este ou 1 outro produto contendo Qel e ou SDHI
Couve-repolho	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata f. alba</i>	-	-	Esterilidade	<i>Stemphylium</i> sp.	Lusomorange, SA (Apartado 66, 7630-908 S. Teotónio)	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas	2 / 7 - 10	1000 L/ha	- 1,25 kg/ha	3 / -	Máximo 2 tratamentos por ciclo cultural, com este ou 1 outro produto contendo Qel e ou SDHI
Couve-lombarda	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>sabauda</i>	-	-	Mancha-das-folhas	<i>Mycosphaella brassicicola</i>	Quinta Fresca Lda., Rua da Arancada, s/n, 8590-141 Albara, Castro Marim, Faro, Portugal	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ao aparecimento dos primeiros sintomas ou em condições favoráveis à doença	2 / 7 - 10	1000 L/ha	1,5 kg/ha	14 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou outros fungicidas que contenham Qel e/ou SDHI em mais do que 2 tratamentos por época vegetativa
Couve-lombarda	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>sabauda</i>	-	-	Alternariose	<i>Alternaria brassicae</i> / <i>Alternaria brassicicola</i>	Quinta Fresca Lda., Rua da Arancada, s/n, 8590-141 Albara, Castro Marim, Faro, Portugal	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ao aparecimento dos primeiros sintomas ou em condições favoráveis à doença	2 / 7 - 10	1000 L/ha	1,5 kg/ha	14 / -	Para evitar o desenvolvimento de resistências, não aplicar este produto ou outros fungicidas que contenham Qel e/ou SDHI em mais do que 2 tratamentos por época vegetativa
Couve-lombarda	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>sabauda</i>	-	-	Esterilidade	<i>Stemphylium</i> sp.	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Máximo 2 tratamentos por cultura, com este produto ou outros fungicidas contendo Qel e ou SDHI
Morangueiro	<i>Fragaria x ananassa</i>	-	P	Aranhão-amarelo	<i>Tetranychus</i>	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas (BRCH 115-69)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Máximo 2 tratamentos por cultura, com este produto ou outros fungicidas contendo Qel e ou SDHI
Morangueiro	<i>Fragaria x ananassa</i>	-	P	Acaro-do-morangueiro	<i>Phytoseiulus pallidus</i>	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas (BRCH 115-69)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Máximo 2 tratamentos por cultura, com este produto ou outros fungicidas contendo Qel e ou SDHI
Ornamentais (folhas e flores)	-	Inclui herbáceas e arbustos	P	Aranhão-amarelo	<i>Tetranychus urticae</i>	BASF	SIGNUM	AV	0296	Fungicida	boscalide + piraclostrobina	Tratar preventivamente ou ao aparecimento dos primeiros sintomas (BRCH 115-69)	2 / 7 - 10	200 - 1000 L/ha	1 kg/ha	14 / -	Máximo 2 tratamentos por cultura, com este produto ou outros fungicidas contendo Qel e ou SDHI