

BASF Portuguesa Lda.
Rua 25 de Abril, nº 1
2689-538 PRIOR - VELHO
Tel.: 21 949 99 00
Fax: 21 949 99 45
www.agro.bASF.pt

Focus Ultra®

Herbicida

Tecnologia
alemã
para o campo

BASF
The Chemical Company

Focus Ultra®

Herbicida de pós-emergência selectivo para o controlo de infestantes gramíneas.



O FOCUS ULTRA® é um herbicida de pós-emergência, de acção sistémica, indicado para combater gramíneas anuais e vivazes nas culturas de vinha, pereira, macieira, pessegueiro, beterraba sacarina, batateira, alho, couve-brócolio, couve-de-bruxelas, couve-repolho, couve-flor, couve-galega, couve-lombarda, couve-portuguesa, couve-rôxa, ervilheira, feijoeiro, feijão verde, cenoura, faveira, girassol, alface, colza, aipo, alho-porro, tabaco, amendoim e arroz (antes da sementeira para controlo do arroz-bravo).

Infestantes susceptíveis

Anuais: Milhã digitada (*Digitaria sanguinalis*); balancos (*Avena spp.*); milhã-pe-de-galo (*Echinochloa crus-galli*); azevénas (*Lolium spp.*); *Phalaris spp.*; pega-saias (*Setaria verticillata*); *Bromus spp.*; *Agrostis spp.*; milhã-verde (*Setaria viridis*); arroz-bravo (*Oryza sativa*).

Vivazes: Grama (*Cynodon dactylon*); escalracho (*Panicum repens*); grama-francesa (*Elymus repens*); graminhão (*Paspalum paspalodes*).

Época de aplicação

O FOCUS ULTRA® deve ser aplicado com a cultura já instalada e as infestantes em estado de crescimento activo.

Aplicar desde a fase de 3 folhas até início do afilhamento.

Doses de aplicação


Infestantes anuais: 2,0 l/ha.

Infestantes vivazes: 4,0 l/ha.

CONTROL DE ARROZ BRAVO EM ARROZ

Descrição do problema

No nosso país variedades de arroz espontâneas como o arroz-bravo, selvagem ou vermelho infestam áreas consideráveis de regiões arrozeiras.



Cynodon dactylon.



Setaria spp.

Dotadas de grande vigor, estas infestantes exercem uma elevada competição quanto ao espaço, luz e elementos nutritivos, incluso em maior quantidade que outro tipo de infestantes. A panícula de arroz bravo desgrana prematuramente, o que favorece uma rápida infestaçao. A presença de grãos de arroz-bravo na colheita representa uma depreciação no preço final.

A solução contra o arroz bravo

Sistema de tratamento do arroz bravo

- Inundar os canteiros, após a preparação do terreno para a sementeira, mantendo um nível de água baixo (2 cm) - provocar a germinação do arroz bravo.
- Após a emergência da maioria do arroz bravo (15-21 dias após o alagamento) retirar a água dos canteiros o mais rápido possível.
- Aplicar o FOCUS ULTRA® a 2 l/ha. O terreno deve estar humido, com as infestantes fora de água.
- 24 horas depois do tratamento, alagar os canteiros (15 cm) o mais rapidamente possível, mantendo a água parada durante 24 h. Fazer circular a água durante 2 dias.
- Realizar a sementeira.

Infestantes resistentes

Dicotiledóneas em geral e ainda o cabelo-cão (*Poa annua*) e junças (*Cyperus spp.*).

Advertências

Nunca tratar sem que o arroz bravo esteja emergido, nem com o canteiro seco.

FOCUS ULTRA® não é volátil e resulta selectivo para a maioria dos cultivos de folha larga (batatas, colza, ervilhas, feijão..). não obstante durante a sua aplicação deve ter-se em conta a possível deriva do produto para campos vizinhos, para evitar que possa afectar os cultivos de gramíneas já nascidos.

Depois do tratamento com FOCUS ULTRA® só se podem semear os cultivos autorizados.

Em caso de dúvida consultar o serviço técnico da BASF.

Cultura	Usos autorizados	Intervalo de segurança
Macieira, pereira, pessegueiro, videira e alho.	Infestantes anuais e vivazes.	4 semanas.
Alface e alho porro.	Infestantes anuais e vivazes.	6 semanas.
Cenoura, ervilheira e feijoeiro.	Infestantes anuais e vivazes.	7 semanas.
Couve e tabaco.	Infestantes anuais e vivazes.	8 semanas.
Aipo.	Infestantes anuais e vivazes.	11 semanas.
Amendoim, batateira e beterraba sacarina.	Infestantes anuais e vivazes.	12 semanas.
Girassol.	Infestantes anuais e vivazes.	14 semanas.

Composição

Concentrado para emulsão com 100g/l ou 10,9% (p/p) de cicloxicidime.

Características

Herbicida sistémico e selectivo com uma grande rapidez de acção, para o controlo de infestantes gramíneas, anuais e vivazes, em culturas de folha larga.

- Actua sobre os tecidos meristemáticos.
- Absorvido rapidamente pelas folhas das infestantes, 1 hora após a aplicação já não é lavado pela chuva.
- Amplo período de aplicação, podendo ser utilizado desde os primeiros estádios de desenvolvimento das infestantes até ao início do afilhamento.
- Aconselhado em Protecção Integrada.