

# Akris®

A base para a construção de estratégias herbicidas adaptadas a cada parcela de milho

- Herbicida sistêmico com ação residual
- Controlo de uma amplo espectro de infestantes gramíneas e de folha larga
- Pré-emergência e pós-emergência precoce

 **BASF**

We create chemistry

**Composição** 280 g/l de dimetenamida-P e 250 g/l de terbutilazina

**Formulação** Suspo-emulsão (SE)

**AV n.º** 1010

**Dose** 2 - 3 l/ha. Utilizar a dose mais elevada em solos mais pesados ou com fortes infestações de erva-moira, erva-feijoeira ou milhã-pé-de-galo e a dose mais baixa em solos leves.

**Aplicação** Em pré-emergência do milho, aplicar o Akris® após a sementeira e antes da emergência da cultura.

- A humidade do solo é indispensável para a boa eficácia do Akris®
- No caso de aplicação com pouca humidade no solo e tempo seco é conveniente realizar uma incorporação, de preferência através de uma rega ligeira, 10-15 mm.

Em pós-emergência do milho, aplicar o Akris® a partir do estado de 2 folhas do milho, estando as infestantes na fase inicial de desenvolvimento (1-2 folhas para infestantes gramíneas e 2-3 para dicotiledóneas anuais.

**Infestantes muito susceptíveis:** Malvão (*Abutilon theophrasti*); *Acalypha virginica*; Bredos (*Amaranthus retroflexus*; *Amaranthus blitoides*); Âmio-vulgar (*Ammi majus*); Morrião (*Anagallis arvenses*); Aveia-louca (*Avena fatua*); *Bidens tripartita*; Mostarda selvagem (*Brassica kaber*); Catassol (*Chenopodium album*); *Chenopodium ficifolium*; Figueira-do-inferno (*Datura stramonium*); Milhã-digitada (*Digitaria sanguinalis*); *Diplotaxis eruroides*; Milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*); Fumária (*Fumaria officinalis*); Amor-de-hortelão (*Galium aparine*); *Galium palustre*; Erva-da-moda (*Galinsoga parviflora*); Erva-das-verrugas (*Heliotropium europaeum*); Glória-da-manhã (*Ipomoea purpurea* var. *diversifolia*); Lapresto (*Lapsana communis*); Camomila-vulgar (*Matricaria chamomilla*); Milho-de-canário (*Panicum miliaceum*); *Panicum dichotomiflorum*; Papoila (*Papaver rhoeas*); Raspa-saias (*Picris echioides*); Pêlo-de-cão (*Poa annua*); Corriola-bastarda (*Polygonum aviculare*); Erva-feijoeira (*Polygonum convolvulus*); Mal-casada (*Polygonum lapathifolium*); Erva-pessegueira (*Polygonum persicaria*); Beldroega (*Portulaca oleracea*); *Rorippa* spp.; Labaça (*Rumex crispus*); Barrilha-espinhosa (*Salsola kali*); Tasneirinha (*Senecio vulgaris*); *Setaria faberi*; Milhã-verticilada (*Setaria verticillata*); Milhã-de-cabecinha (*Setaria viridis*); Erva-moura (*Solanum nigrum*); Serralha (*Sonchus oleraceus*); Morugem (*Stellaria media*); Violeta-dos-campos (*Viola arvenses*); *Xanthium* spp.

**Infestantes susceptíveis:** Cenoura-brava (*Daucus carota*).

**Infestantes moderadamente susceptíveis:** Corriola (*Convolvulus arvenses*); Junça-de-conta (*Cyperus rotundus*); Trigo sarraceno (*Fagopyrum esculentum*); Girassol (*Helianthus annuus*); Bico-de-pomba (*Geranium dissectum*).

### Precauções biológicas

- Não atingir terrenos e culturas vizinhas da área a tratar. No caso particular de haver girassol, pepino, linho e trigo mourisco como cultura vizinha, recomendamos deixar uma distância de 5 m entre o limite da área a tratar com Akris® e as culturas indicadas, ou em alternativa, a utilização de bicos anti-deriva.
- Não utilizar o Akris® em pré-emergência em solos arenosos e pobres em matéria orgânica.
- Um intervalo de 10 meses deve mediar entre o tratamento com Akris® e a instalação de culturas sensíveis, nomeadamente: aboboreira, alface, batateira, beterraba, espinafre, melancia, meloeiro, pepino, pimenteiro e tomateiro. Para outras culturas deve mediar um período de 7 meses.
- No caso de destruição accidental da cultura, pode-se semear milho, trigo, cevada e colza após ter realizado uma lavoura profunda (≥ 20 cm).
- Não misturar o herbicida com adubos líquidos.

### Flexibilidade de utilização

- Para o controlo específico de infestantes mais difíceis, ex. junça, recomendamos a mistura com herbicidas com base em mesotriona ou sulcotriona.

BASF Portuguesa, SA  
Rua 25 de Abril, n.º1 – 2º Piso.  
2685-368 Prior Velho

Tel. 219 499 900  
Fax 219 499 949

www.agro.basf.pt

### 10 gestos responsáveis

#### ANTES DA APLICAÇÃO



#### DURANTE



#### DEPOIS DA APLICAÇÃO

